

الفينولات Phenols

تعد الفينولات ثاني أكبر مجموعة من مركبات الايض الثانوي في النبات بعد القلويدات وتحتوي جزيئة الفينول البسيط على حلقة بنزين ترتبط بها مجموعة او اكثر من مجاميع الهيدروكسيل (OH) وتوجد هذه المركبات في النباتات الراقية وغير الراقية كالسرخسيات والحزازيات والعديد من الاحياء الدقيقة وتسمى الفينولات أيضا بالمركبات العطرية Aromatic compound لرائحتها المميزة او تسمى بالمركبات الحلقية المغلقة ويعزى سبب التسمية الى احتواء المركبات الفينولية على حلقة البنزين وتتميز هذه المركبات بوجود مجموعة هيدروكسيل (OH) مرتبطة مباشرة بالحلقة الاروماتية و احيانا ترتبط عدة مجاميع مختلفة بالمركب الفينولي مثل مجموعة الهيدروكسيل والكاربوكسيل (COOH) ومجموعة المثل (CH₃) وقد توجد المركبات الفينولية بهيئة مركبات ذات سلسلة مفتوحة او تسمى اليفاتية (غير حلقة) وتختلف الفينولات البسيطة عن الدهون :-

1- تذوب جزئيا في الماء.

2- قليلة الذوبان في المذيبات العضوية لكنها تذوب عندما يكون الوسط حامضيا PH منخفض وتعزى قابلية الفينولات الضعيفة للذوبان في الماء والمذيبات العضوية غير القطبية الافي الوسط الحامضي الى عدم تأين مجموعتي الـ (OH) و (COOH) في المركب الفينولي.

ان معظم المركبات الفينولية لا توجد حرة داخل الخلية النباتية بل توجد مرتبطة مع جزيئة او عدة جزيئات من السكريات لتكون على هيئة مركبات جليكوسيدية لذا نلاحظ ان بعض التصنيفات تدرج المركبات الفينولية ضمن المركبات الجليكوسيدية، وتوجد الفينولات أيضا مرتبطة مع السكريات الدهنية بواسطة اصرة استر سكرية مع احدى

مجاميع الهيدروكسيل والكاربوكسيل لتكون مركبات كلايكوليبيد Glycolipids تخزن في الفجوات العصارية للخلية، وان بعض الاحماض الامينية مثل التربتوفان Tryptophan والتايروسين Tyrosine والفينيل النين Phenylalanine تصنف من ضمن المركبات الفينولية العضوية الحلقية المغلقة وذلك لتشابه طريقة ايض هذه الحوامض الامينية مع المركبات الفينولية.

فوائد الفينولات

- 1- التخلص من ضرر السطوع الشمس الطويلة خاصة صيفا اذ تمتص الفينولات الطاقة الضوئية الفائضة عن حاجة النبات لحماية مركباته الحيوية.
- 2- تكيف بيئة الخلية من خلال تنظيم درجة الحرارة من الغليان والانجماد وتنظيم المحتوى الازموزي.
- 3- تسبب الفينولات سبات بعض البذور مثل فعالية مركب الكومارين Coumarin.
- 4- تعطي الفينولات الالون الزاهية للأزهار الذي يساعد في جذب الحشرات لأغراض التلقيح.
- 5- تؤدي الفينولات دورا مهما في منع إصابة بعض النباتات بالأمراض مثل حامض Protocatechuic acid الذي يمنع مرض التبقع الفطري في البصل، وان النسبة العالية من حامض Chlorogenic acid تمنع مرض جرب البطاطا او جرب التفاح اذ ان الضرر الميكانيكي الذي يحدث للبطاطا يسبب حدوث اسوداد للدرنة ناتج عن حدوث عملية الاكسدة بأنزيم Phenol Oxidase ثم يحدث تجمع للفينولات Phenolization مسببة بذلك اسوداد في الانسجة المقطوعة اذ تعمل هذه الفينولات كمضادات طبيعية للفطريات.
- 6- تسيطر على فعالية تكوين بعض الانزيمات وتنظم نمو وتطور النبات.

- 7- وجد ان المركب الفينولي الكومارين Coumarine يتحول الى كحول Dicoumarol
نو التأثير السمي على الحيوانات التي تتغذى على البرسيم بعد خزنه لفترة طويلة.
- 8- تسيطر على فعالية تكوين بعض الانزيمات وتنظم نمو وتطور النبات.
- 9- تعد الفينولات أحد الصور التي يخزن بها النبات الطاقة والمغذيات التي يمكن للنبات
استرجاعها عند الحاجة اليها.
- 10- تقوم بدور مضاد للأكسدة Antioxidant اذ انها تعرقل اكسدة الكلوروفيل والهرومونات.

تصنيف الفينولات Phenols classification

تصنف الفينولات وفقا لهيكلها الكربوني الى

أولاً: - الفينولات البسيطة Simple phenolics

تحتوي هذه المجموعة في تركيبها حلقة بنزين مرتبطة بواحد أو أكثر من مجاميع الهيدروكسيل
مثل مركب Hydroquinone ومركب Arabutin.

ثانياً: - الاحماض الكربوكسيلية الفينولية Phenol Carboxylic Acids

تحتوي هذه المجموعة في تركيبها على حلقة بنزين مرتبطة بمجموعة حامضية هي مجموعة
الكربوكسيل COOH فضلا عن ارتباط واحد أو أكثر من مجاميع الهيدروكسيل. مثل مركب
Hydrobenzoic acid ومركب Protocatechuic acid وفي بعض المركبات قد ترتبط
مجاميع أخرى بالحلقة مثل مجموعة الميثيل CH₃ مثل مركب Hydroxy Phenolic acid.

ثالثاً: - الفينيل بروبان ومشتقاته Phenylpropanes and Derivatives

يتكون الهيكل الكربوني لهذه المجموعة من حلقة بنزين إضافة الى سلسلة جانبية من ثلاث
ذرات كربون، وتتنتمي لهذه المجموعة اهم الفينولات داخل النبات مثل Cinnamic acid و
Coumaric acid.

رابعاً: - مشتقات الفلافين Flaven Derivatives

تضم هذه المجموعة مشتقات الفلافونات التي تتميز بالهيكل الكربوني للفلافون الذي يتكون من ثلاث حلقات بنزين هي الحلقة (A) والحلقة (B) ثم الحلقة الوسطية (C) التي تحتوي على الاوكسجين وتشمل هذه المركبات مجموعتين هما الفلافونات والانتوسيانات.

البناء الحيوي للفينولات

يوجد عدة مسالك لبناء النظام الحلقي Aromatic system للمركبات الفينولية في النباتات الراقية

أولاً: مسلك حامض الشيكيميك The Shikimic acid pathway

يعد هذا المسلك في بناء حامض الشيكيميك وكذلك خطواته الوسطية ذات أهمية كبيرة للنبات ليس في انتاج الفينولات فحسب بل في بناء الاحماض الامينية الأروماتية Phenylalanine و Tyrosine و Tryptophan

ثانياً: مسلك الاستيت مالونيت Acetate Malonate Pathway

وهو مسلك مشابه لبناء الاحماض الدهنية اذ يبدا كل منهما بالمرافق الانزيمي Acetyl- COA ويشترك مرافق انزيمي اخر Malonyl- COA ويبدا المسلك الحيوي في بناء الفينولات التابعة لمجموعة الفلافونات بثلاث وحدات من Malonyl- COA التي تتحد معا ثم تحدث عملية نزع لمجاميع الكربوكسيل Decarboxylation بينها ليتحد المركب الناتج في الوقت نفسه مع جزيئة الـ Acetyl- COA لينتج مركب Polyketo acid الذي يتحلق Cyclization بطرق مختلفة لينتج في النهاية فينولات هيدروكسيلية .

اهم مجاميع المركبات الفينولية في النباتات الراقية:

أولاً: مجموعة حامض السيناميك Cinnamic acid

ثانياً: مجموعة الكيومارين

ثالثاً: مجموعة اللكتين

رابعاً: مجموعة الحوامض الكربوكسيلية الفينولية

خامساً: مجموعة مشتقات الفلافونيدات

Dr.Fatimah Ali-Hasan