

## الجيربرا *Gerbera jamesonii*

أزهار عشبية معمرة، موطنها الأصلي أفريقيا وآسيا، تسمى بالانكليزية Transval daisy، تنتمي إلى العائلة المركبة Compositae. يضم هذا الجنس 50 نوعاً تقريباً، ويعتبر النوع *jamesonii* أب لكل الأصناف المنزرعة. ترجع تسميتها إلى العالم الانكليزي Jameson، أما الجنس *Gerbera* فيعود إسمه إلى العالمين النباتيين الالمانيين F. and T. Gerber حيث إهتماما بدراسة هذا النبات. النبات عديم الساق ذو أوراق عديدة مجتمعة عند التاج وهذه الأوراق جلدية كبيرة مفصصة الحواف ولها أعناق طويلة. الأزهار صالحة للقطف جداً ومتعددة الألوان، والحوامل الزهرية طويلة، توجد أصناف أزهارها قاطية وأخرى أزهارها قطمر أو نصف قطمر. تزهر في الربيع والخريف، عمرها المزهري يصل إلى إسبوعين.



تفضل الجيربرا الأماكن النصف مظلمة، تتأثر بالبرد الشديد شتاءً وبالصيف الحار جداً. أفضل درجات حرارة ملائمة لنمو النباتات خلال فصل الشتاء 16-18 °م وخلال الصيف 20-22 °م. لغرض الحصول على نمو خضري نشط وتزهير جيد تكون درجة الحرارة المثلى من 12-24 °م، إضافة إلى توفير تربة خفيفة جيدة الصرف غنية بالمواد العضوية ودرجة حموضتها الملائمة هي 5,5-6,5، تسمد الجيربرا بالسماد الكيماوي المركب N.P.K ، وتضاف العناصر الصغرى مثل الحديد والمنغنيز والنحاس والمولبيديوم ، تعزق التربة لغرض التهوية وتقلب الاسمدة وتزال الحشائش الغريبة.

تزرع الجيربرا في أحواض الأزهار، وللتحديد كما تزرع كنبات أصص. تتكاثر بالبذور وذلك بعد جمعها مباشرة لأن حيويتها قصيرة تصل إلى 3-9 شهور، وحتى ولو خزنت على درجة حرارة ملائمة فإنها تفقد حيويتها بمدة قصيرة. كما تتكاثر أيضاً بالتقسيم ويفضل تطهير مكان القطع ببودرة الفحم، كما يراعى عدم زيادة الرطوبة النسبية حتى لا تتعفن. تصاب الجيربرا بالعنكبوت الأحمر والتربس ومرض الذبول والتبقع والأمراض الفيروسية.

تقطف النورات الزهرية بعد التفتح، وبعد قطفها بساعة توضع بالماء وتشق قاعدة الحامل الزهري لأن ذلك سوف يساعد على تحسين إمتصاص الماء، ثم ندرج الأزهار وتوضع في أكياس أو قراطيس من الورق المقوى ذات قمة مفتوحة وقاعدة مثقوبة ثم ترص في علب كرتون بالتبادل، وتقلل الكرتون ويكتب عليها البيانات وتشحن، بعد وصولها يجب فتحها بسرعة ثم توضع الأزهار في ماء إستعداداً لبيعها.