


محاضرة (2)

الخلية النباتية Plants cell

الخلية هي الوحدة التركيبية والوظيفية الأساسية للحياة. وفي الكائنات وحيدة الخلية تعتبر الخلية كائن حي كامل بينما في الكائنات الراقية عديدة الخلايا فإنه يوجد تجمع لعدد كبير من الخلايا المختلفة والتي تنظم بكل دقة لتكون نسيجاً و الأنسجة المختلفة تكون عضواً، و عدة أعضاء مختلفة تكون الكائن الحي سواء كان نبات أو حيوان من خلال عملية النمو Growth والتطور Development أو التغير الشكلي Morphogenesis والتي يحدث خلالها تخصصات وظيفية. وبالرغم من تعدد وظائف للخلايا إلا أن الخلايا متشابهة إلى حد كبير في احتوائها على عدد من العضيات التي يتم فيها التفاعلات الكيماوية كذلك تتشابه في الأغشية البلازمية والأحماض النووية DNA و RNA والتي تعمل كمكونات أساسية في ميكانيكية نقل المعلومات في جميع الخلايا.



خلية نباتية نموذجية

تركيب الخلية النباتية :

الخلايا تختلف في الوظيفة والشكل والحجم وتعقد الجدار . تتكون الخلية من جزئين متميزين هما جدار الخلية و البروتوبلاست.


اولاً: "الجدار الخلوي cell wall"

وهو تركيب متين نسبياً وشبه صلب، له درجة عالية من المرونة مما يمكنه من مقاومة الشد والالتواء دون ان يتشقق، تكون الجدران الخلوية شبكة مترابطة في جسم النبات له وظيفة القوة والاسناد والحماية لجسم النبات كما له وظائف اخرى فهو يشترك في امتصاص وانتقال الماء والمعادن وفي الإفراز وفي بعض النشاط الانزيمي. كما يعتقد علماء امراض النبات ان الجدر الخلوية ومكوناتها تلعب دوراً هاماً في مقاومة بعض الأمراض.

يتميز جدار الخلية مجهرياً إلى ثلاثة أجزاء يمكن ذكرها حسب النشأة والتكوين وهي الصفيحة الوسطى، والجدار الابتدائي، والجدار الثانوي.

1 - الصفيحة الوسطى Middle lamella

وتتكون أساساً من مواد بكتينية قد تتحد مع الكالسيوم على صورة بكتات الكالسيوم والمغنيسيوم، كما قد تدخل مادة اللجنين في تكوينها وخاصة في الأنسجة الخشبية، وتربط الصفيحة الوسطى بين الخلايا المفردة لتكوين النسيج وتقع بين الجدر الابتدائية للخلايا المتجاورة وتظهر تحت المجهر بوضوح نظراً لاختلاف موادها عن بقية أجزاء الجدار



س/ما الأهمية الفسلجية للصفيحة الوسطى (middle lamella)


ج/ تعمل على التصاق الخلايا ببعضها ومن الملاحظ انه في الثمار زائدة النضج تصبح الصفيحة الوسطى اقل صلابة فيصبح ارتباط الخلايا ببعضها ضعيف مما يسبب تحلل الثمار.

2- الجدار الابتدائي primary cell wall


هو الجدار الأساسي والأول الذي يتكون أثناء نمو الخلية (إذا أخذ بعين الاعتبار أن الصفيحة الوسطى عبارة عن مواد بكتينية وليست جداراً متميزاً) كما أنه الجدار الوحيد في كثير من أنواع الخلايا ويتكون من مادة السليلوز وأشباه السليلوز، وقد يدخل اللجنين في تركيبه في بعض الخلايا، ويختلف سمكه من خلية إلى أخرى حسب ترسب مادة السليلوز فقد يكون رقيقاً كجدر خلايا اندوسبيرم بذرة نخيل البلح وينمو الجدار الابتدائي مع بدء الخلية بالنمو كما يتبع ذلك فترة متصلة أو منفصلة من النمو في سمكه.

3 - الجدار الثانوي secondary cell wall

وهو الجدار الذي يلي الجدار الابتدائي في التكوين ويتكون أساساً من السليولوز أو أشباه السليولوز، وقد يتغير هذا التركيب نتيجة لترسب مادة اللجنين ومواد أخرى ، ويبدأ ترسب مادة الجدار الثانوي عادة بعد توقف الجدار الابتدائي عن الزيادة في مساحة السطح وهو الوقت الذي تقف فيه الخلية عن النمو والاستطالة.




تركيب الجدار الخلوي للخلية النباتية



الجدار الخلوي ومكوناته

عندما يترسب الجدار الثانوي أو الابتدائي فإنه يترك بعض المواقع بدون ترسيب ويطلق على هذه المواقع اسم **النقر Pits** وهي اما **نقر بسيطة** وتتميز هذه بأن الجدار الثانوي فيها لا يتقوس فوق تجويف النقر لذلك لا تتميز النقر البسيطة إلى غرفة وقناة النقرة بل تكون هيئة قناة تمتد بين غشاء النقرة وتجويف الخلية.


أما في النقر المضفوفة فإنها تتميز بامتداد الجدار الثانوي وتقوسه فوق غرفة النقرة مكوناً حافة مرتفعة تسمى ضفة النقرة.



النقر

الروابط البلازمية : Plasmodesmata

يتصل سيتوبلازم الخلايا النباتية ببعضها البعض بواسطة خيوط بلازمية دقيقة تخترق الجدار الخلوي عن طريق النقر مما يجعل جسم النبات تركيباً عضوياً واحداً، وظيفتها تعمل كقنوات نقل المواد الغذائية من خلية إلى أخرى وبخاصة في الأنسجة التخزينية.



LIFE 8e, Figure 15.20

LIFE: THE SCIENCE OF BIOLOGY, Eighth Edition © 2007 Sinauer Associates, Inc. and W. H. Freeman & Co.

الروابط البلازمية


ثانياً: البروتوبلاست Protoplast

وتتكون من مكونات بروتوبلازمية (حية) ومكونات غير بروتوبلازمية (غير حية) وهي كما يلي :

المكونات الحية للخلية النباتية :

1- الساييتوبلازم Cytoplasm

ويتكون من الاندوبلازم والأغشية البلازمية والشبكة الأندوبلازمية . والاندوبلازم هو محلول غروي حقيقي يختلف في لزوجته باختلاف الخلية ونوعها وعمرها ويحتوي على الماء بنسبة 85-90%. كما يحتوي على انواع مختلفة من البروتينات والدهون في حالة غروية وسكريات وأملاح في حالة ذائبة.




السايتوبلازم

2- النواة Nucleus :

هي اهم مكونات الخلية فهي المركز الرئيس لتنظيم العمليات الحيوية للخلية ومن خلال انقسامها تتكاثر الخلايا وتفقد بعض خلايا النبات انويتها نتيجة لتغلظ جدرها وتخصصها كما في الانسجة الدعامية او التوصيلية مثل الالياف واوعية الخشب ويختلف شكل النواة تبعاً لنوع الخلية، اذ تكون النواة كروية في الخلايا الحديثة اما في الخلايا المسنة تكون النواة مفلطحة وقد تكون مستطيلة كما يختلف حجم النواة باختلاف حجم الخلية ففي الخلايا الحديثة تكون نواتها كبيرة وتشغل حيزاً كبيراً فيها اما في الخلايا المسنة فان حجم النواة يشغل حوالي 10% فقط من حجم الخلية. تحاط النواة بغشاء مزدوج يسمى غلاف النواة يحيط بمادة هلامية تملأ فراغ النواة تسمى السائل النووي يحتوي على شبكة من الخيوط المتداخلة تسمى الشبكة الكروماتينية أو الكروماتين أي المادة الملونة، كما تحتوي النواة على النوية وهي جسم مستدير لا يصطبغ بالصبغات التي تظهر الكروماتين .

تشرح نبات م/2




التركيب التشريحي للنواة في الخلية.

النواة أكثر لزوجة من السايكوبلازم و تحتوي على نسبة أكبر من الأحماض النووية، إذ يوجد نوعان رئيسيان من الأحماض النووية هما : الحامض النووي الذي اوكسي رايبوز (DNA) و الحامض الرايبوزي النووي (RNA) Ribonucleic acid يتكون كلاهما من وحدات تسمى نيوكليوتيدات Nucleotides . و يعرف الجين بأنه عبارة عن جزء DNA المتكون من عدد من النيوكليوتيدات التي تختلف باختلاف الجين و يتحكم بصفة وراثية معينة .

3- الميتوكوندريا : Mitochondria

وهي عبارة عن أجسام بروتوبلازمية حيه لها القدرة على النمو والانقسام .وهي تحاط بوحدين غشائيتين يضمان بداخلهما الحشوة والحامض النووي RNA وانزيمات دورة كريس ومركبات عديدة من نواتج التفاعلات الانزيمية والسيكرومات، وظيفتها القيام بعملية التنفس و انتاج الطاقة المستخدمة في الخلية ولذلك يلاحظ زيادة كثافتها في الخلايا النشطة مثل خلايا الانسجة المرستيمية.



تركيب الميتوكوندريا في الخلية.



الميتوكوندريا

4- الريبوسومات Ribosomes

وهي اجسام بروتوبلازمية صغيرة تظهر على هيئة حبيبات دقيقة تتركب من حامض RNA وبروتينات نووية وتحتوي على انزيمات خاصة بعمليات البناء والاسيما بناء البروتينات، وقد تكون حرة في السايوبلازم او على اسطح الشبكة الاندوبلازمية وتعد الريبوسومات المركز الرئيسي لتخليق البروتين في الخلية .

5- الاجسام الكروية Spherosomes :

وهي أجسام بروتوبلازمية صغيرة كروية تتكون من حشوه كثيفة تحاط بغشاء مفرد وتحتوي على انزيمات تقوم بتحليل الجزيئات الكبيرة للمواد الداخلة في تركيب بروتوبلازم الخلية وتشابه الليسوسومات lysosomes الموجودة في الخلايا الحيوانية.

6- جهاز كولجي Golgi Apparatus :

ويظهر تحت المجهر الالكتروني ككومة مكدسة من 5-15 من الاغشية المرتبطة والمفلطحة والمنبسطة وعديد من الحويصلات الكروية الصغيرة تظهر كمجموعة حول هذه الاغشية. وتؤدي هذه الاجسام مع الشبكة الاندوبلازمية دوراً هاماً في تكوين الجدار الخلوي ، وتخزين وحفظ البروتينات الى اماكن الاستهلاك داخل وخارج الخلية، وتكوين الحويصلات .



الشكل يوضح: التركيب التشريحي لجهاز كولجي بالخلية.

7- البلاستيدات plastids :


وتعرف البلاستيدات بأنها عبارة عن أجسام بروتوبلازمية لها القدرة على النمو والانقسام وهي عضيات توجد في الخلايا النباتية ولا توجد في الخلايا الحيوانية، غير أنها تنعدم في البكتريا والفطريات والطحالب الخضر المزرقّة، تنشأ من تراكيب صغيرة موجودة في الخلايا المرستيمية تسمى البلاستيدات الأولية proplastids وتمتاز بقابلية النمو والانقسام. و تكون هذه العضيات قليلة العدد وكبيرة بالحجم في النباتات الواطنة كالطحالب مثلاً، إلا أنه في النباتات الراقية تكون صغيرة الحجم وكثيرة العدد، تختلف البلاستيدات في أشكالها وإحجامها والصبغات التي تحتويها وتمتاز البلاستيدات بقابلية التحول من نوع إلى نوع آخر.

أنواع البلاستيدات Type of plastids :

توجد البلاستيدات بثلاثة أنواع رئيسية وهي البلاستيدات الخضر والبلاستيدات الملونة والبلاستيدات عديمة اللون .

1- البلاستيدات الخضراء chloroplast :

وتتميز بلونها الأخضر ووظيفتها الأساسية القيام بالتركيب الضوئي photosynthesis حيث تقوم بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية وذلك ببناء المركب عالي الطاقة (ادينوسين ثلاثي الفوسفات) ATP و NADPH₂. وتتركب البلاستيدات الخضر من غشاء مزدوج يحيط بأرضية تدعى السدى أو الستروما Stroma وأحياناً تسمى matrix وتضم أرضية البلاستيدة حبيبات تدعى Grana وكل Grana واحدة تكون من مجموعة من الأقراص الغشائية المعقدة يطلق عليها Thylakoids وتكون منضدة فوق بعضها البعض وتتصل حبيبات الكرانا مع بعضها بأغشية فيما بينها تسمى أغشية ما بين الكرانا . وتوجد عادة في الأجزاء المعرضة لضوء الشمس. تحتوي البلاستيدات على صبغات منها الكلوروفيلات (Chlorophyll A & Chlorophyll B) والكاروتينات والزانثوفيلات.



تركيب البلاستيدة الخضراء

البلاستيدات في خلايا الورقة

- 2- بلاستيدات الملونة chromoplast:** ذات ألوان مختلفة عدا الأخضر مثال : الأصفر- البرتقالي- الأحمر. حيث تحتوي على أصباغ الكاروتين و تختلف في شكلها منها : القرصي- الكروي- العصوي . وظيفتها تكون مسؤولة عن ألوان الثمار والأزهار في النبات.
- 3- البلاستيدات عديمة اللون leucoplasts:** وهي نوع من البلاستيدات التي توجد عادة في كل أجزاء النبات البعيدة عن ضوء الشمس (كالجذور والدرنات والبذور) . وظيفتها الخزن فقد تخزن النشا وتدعى Amyloplast أو خزن الزيت وتدعى Elaioplasts. توجد البلاستيدات الخازنة للنشا في البطاطا إما البلاستيدات الخازنة للزيت فتوجد في الحزازيات وكذلك ذوات الفلقة الواحدة, إلا أنها قد تقوم بخزن الاثنين كما في نبات السوسن.


المكونات الغير حية في الخلية النباتية : وتشمل

1- الفجوات Vacuoles

تتميز معظم الخلايا الحية في النبات بوجود فجوات تحتوي بداخلها على العصير الخلوي ويفصلها عن الساييتوبلازم غشاء الفجوة ، وقد تحتوي الفجوة على البلورات وحببيبات النشا ، مما يعتبر نواتج ايضية او مواد مختزنة ، ويختلف عدد الفجوات في النبات باختلاف نوع الخلية وعمرها والمنطقة التي توجد فيها. وظيفتها المحافظة على ضغط الامتلاء في الخلية وهو مهم في التحكم في حركة الماء.




الفجوة




حجم الفجوات (تظهر باللون الأصفر) في الخلية (الفتية Young) و(المسنة Older)

2- البلورات Crystals

توجد في كثير من انواع الخلايا النباتية وتختلف في تركيبها الكيميائي فقد تكون بشكل مكعبات صغيرة في درنات البطاطا، وقد تكون سكرية كبلورات الايثولين الكروية ، وتعتبر بلورات املاح الكالسيوم اكثر البلورات انتشاراً بالخلايا النباتية، وقد يكون شكلها اما ابرية او معينة الشكل او نجمية . يطلق على الخلية التي تحتوي البلورة بالخلية الحجرية. والبلورة التي تحتوي على نتوءات والتي لاتحتوي فانها غير مكتملة. ان الغرض من تكون البلورات في الخلية هو التخلص من سمية حامض الاوكساليك عن طريق تحوله الى مركبات غير ذائبة على هيئة بلورات.




حوصلة حجرية من كربونات الكالسيوم



بلورة ابرية + نجمية

3- حبيبات النشا Starch grains

يعد النشا من اهم المكونات غير البروتوبلازمية التي تتكون بداخل الخلية النباتية، ويوجد النشا بصورة حبيبات تختلف شكلاً وحجماً حسب النبات المكون، وكثيراً ماتظهر حبيبات النشا في شكل حلقات متداخلة وقد تكون وسطية أي مركزية كما في القمح وقد تكون جانبية لامركزية كما في البطاطا.





حبيبات النشا تحت المجهر

4- الدهون والزيوت والشموع Fats, Oil and Waxes

هي مواد غير حية تعتبر ذات أهمية كبيرة في النباتات المستعملة تجارياً أي ذات أهمية اقتصادية، فالدهون والزيوت مواد مختزنة في النبات توجد في البذور والثمار، وقد توجد الدهون في حالة صلبة أو سائلة كنقط دهنية كما قد توجد على هيئة بلورات، كما في بعض أنواع النخيل حيث تكون الخلية ممتلئة ببلورات إبرية قصيرة من الدهون. أما الشموع فهي مادة وقائية كثيرة الانتشار في النبات تنرسب فوق خلايا البشرة لكل من الساق والورقة والثمار ولكنها تفرز منها، وتعرف الشموع بمظهرها اللامع فوق بشرة الأوراق والسيقان.

5- الحبيبات الأليرونية Aleurone grains

تخزن البروتينات في الخلايا النباتية على شكل حبيبات تسمى بالحبيبات الأليرونية التي يكثر وجودها في سائل الاجزاء النباتية خاصة في سويداء البذور كما في الخروع والحنطة والذرة وغيرها وتكون حبيبة الأليرون ببيضوية الشكل .



وايضاً: توجد مواد اخرى ضمن المكونات غير الحية في الخلية مثل القلويدات والتانينات والصبغات والمواد الراتنجية .


الجزء العملي للمحاضرة الاولى

التعرف على الخلية النباتية تحت المجهر (إعداد شريحة البصل)

- الأدوات والمواد المستخدمة :- مجهر مركب - شرائح وأغطية - سكين تشريح او شفرة حادة -صبغة اليود - قطارة صغيرة - ملقط - بصل يابس

- خطوات العمل :


- 1- خذ بصلة واقطعها بالمشرب إلى 4 بعد إزالة قشرتها الخارجية .
- 2- امسك بأحد الأرباع ستجد أنه مكون من أجزاء من حلقات قرصية على شكل طبقات بينها غشاء رقيق .
- 3- استخدم ملقطاً نظيفاً لفرد هذه الطبقة الرقيقة على شريحة زجاجية نظيفة
- 4- استخدم مشرباً لقص قطعة مساحتها 1سم تقريباً واستبعد الأجزاء الباقية
- 5- ضع قطرة ماء على الغشاء .
- 6- ضع الغطاء الزجاجي الرقيق على العينة .
- 7- ضع قطرة من صبغة اليود على حافة الغطاء الزجاجي . لماذا؟
- 8- ضع الشريحة تحت المجهر المركب .
- 9- ارسم ما تشاهده تحت المجهر مع التأشير.



خلايا البصل

➤ التعرف على اشكال البلورات في الخلايا

الأدوات والمواد المستخدمة : مجهر- أوراق حرشفية للثوم – شرائح زجاجية – غطاء شريحة – ماء مقطر- سكين او شفرة حادة.



خطوات العمل :


- 1- استخراج سلخة رقيقة من ورقة الثوم الخارجية
- 2- افرش النموذج على الشريحة الزجاجية بعد وضع قطرة ماء مقطر في وسط الشريحة
- 3- ضع غطاء الشريحة برفق مع مراعاة عدم تكون فقاعات هواء من خلال الضغط الخفيف على الغطاء .
- 4- افحص الانموذج تحت القوى الصغرى وبعدها تحت القوى الكبرى. بلورة نجمية
- 5- ارسم ماشاهدته تحت المجهر .

➤ التعرف على حبيبات النشا في البطاطا

الادوات والمواد المستخدمة : مجهر – شريحة زجاجية وغطاء الشريحة – بطاطا- محلول اليود المخفف.

خطوات العمل :

- 1- قطع بواسطة السكين الحادة البطاطا واستخرج طبقة رقيقة منها
- 2- ضع قطعة البطاطا الرقيقة على الشريحة الزجاجية
- 3- ضع قطرة من محلول اليود المخفف وذلك لتوضيح معالم حبيبات النشا في البطاطا اذا انها سوف تأخذ لون ازرق باهت.
- 4- ضع غطاء الشريحة ثم افحص الانموذج تحت القوى الصغرى وبعدها تحت القوى الكبرى.
- 5- ارسم ماشاهدته تحت المجهر، حيث تظهر حبيبات النشا حبيبات دقيقة متجمعة مع بعضها في اعداد كبيرة.



حببيات النشا تحت المجهر


نشاط : 

ما الفرق بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية ؟ ارسم الخليتين و لاحظ من خلال الرسم أهم الفروقات ! . ثم دونها ايضاً في دفترك.

المختبر الثاني : انقسام الخلية النباتية plant cell division

دورة حياة الخلية :

هي سلسلة من التغيرات التي تحدثها الخلية ابتداء من بداية تشكلها من الخلية الام وحتى اللحظة التي تنتهي فيها الانقسامات وتنتج خلايا جديدة .



تتخصص بعض الخلايا النباتية في النباتات الراقية في عملية الانقسام الضرورية لاستمرار النمو والتكاثر في النبات وهناك ثلاثة أنماط من الانقسام في الخلية وهي: انقسام مباشر وانقسام غير مباشر وانقسام اختزالي (منصف).







(1) الانقسام المباشر (الانقسام اللاخيطي) Amitosis :

يحدث في الكائنات وحيدة الخلية مثل البكتريا والطحالب الخضراء المزرقمة وبعض الابتدائيات حيث تستطيل الخلية وتتخصر من الوسط ثم تبدأ النواة بالاستطالة وتنقسم الى قسمين كذلك يستطيل الساييتوبلازم وينقسم الى قسمين بعدها يزداد تخصر الخلية مكونة خليتين جديدتين ولا يحدث في هذا الانقسام أي تغير في المادة الوراثية.

(2) الانقسام غير المباشر (الخيطي) Mitosis :

يحدث هذا الانقسام في الخلايا الإنشائية غير المتخصصة في عملية التزاوج (أي في الخلايا الجسمية) تنقسم فيه النواة أولاً حيث تنقسم إلى قسمين متساويين، والثانية انقسام السيتوبلازم حيث ينقسم إلى جزأين مكوناً بذلك خليتين متشابهتين للخلية الأم.

الصور التالية توضح مراحل الانقسام مع الشرح :



<p>1</p> 	<p>ب</p> 
<p>التوية (Nucleolus)</p> 	<p>النور النهائي (Telophase)</p> <p>المحصة النهائية خلتين مشابهيين للتوية الأم وراثيا ويكلا منهما المادة التي الكروموزومات.</p>
<p>التيبة (Cell wall)</p> 	<p>النور النهائي ايلي (Proelophase)</p> <p>تتحول الكروموزومات ايلي كروماتين. يبدأ الغشاء النووي في الظهور، وتظهر التوية. يبدأ انقسام الخلية ايلي خلتين بواسطة تكوين المحصة الخلية.</p>
<p>مستور (Centromere)</p> 	<p>النور الانقلاصي (Anaphase)</p> <p>تتحرك كروماتيد كل كروموزوم في اتجاهين متعاكسين نحو القطب المقابل لكل منهما. نتيجة لانحطال المستوربات يصبح عدد الكروموزومات عدد كل قطب مساو لعدد الكروموزومات في الخلية الاصليه.</p>
<p>جدار الخلية (Cell wall)</p> 	<p>النور الاستوائي (Metaphase)</p> <p>تصطف مستوربات الكروموزومات في منتصف الخلية. تظهر خيوط المستور مسدة بين قطبي الخلية (Cell poles) ويمتددة بالكروموزومات عدد منطقة المستوربات.</p>
<p>جدار الخلية (Cell wall)</p> 	<p>النور التمهيدي (Prophase)</p> <p>تظهر الكروموزومات تدريجيا ايلي ان تغلف نكلها النهائي، تغلف الكروموزومات في انقصر وازداد سمكا. ويظهر كل كروموزوم منحطرا ايلي كروماتينين متصلين في منطقة المستوربين. تتلاشي التوية كما يتلاشي الغشاء النووي.</p>
<p>التوية (Nucleolus)</p> 	<p>النور البيني (Interphase)</p> <p>تظهر النواة التي توسط المستوربات، محاطة بالغشاء النووي، ويها توية أو نكل. تتلاسي مادة الكروماتين ايلي النواة (Chromatin).</p>

(3) الانقسام الاختزالي Meiosis

يحدث هذا النوع من الانقسام في النباتات التي تتكاثر جنسياً عند تكوين الأمشاج Gametes حيث تحتوي الأمشاج على نصف عدد الصبغيات الموجودة في الخلية الأم . وعند التزاوج بين نواة المشيج الذكري ونواة المشيج الأنثوي تتكون البيضة المخصبة والتي تمثل البذرة في النباتات Zygote التي تحتوي على عدد الصبغيات نفسها الموجودة في خلايا نباتات الأبوين، ولهذا تكون العوامل الوراثية في اللاقحة ناتجة عن العوامل الوراثية لكل من المشيجين الذكري والأنثوي، وذلك عن طريق التوزيع العشوائي لهذه الصفات على نواتج الانقسام وكذلك عن طريق ظاهرة العبور (Crossing over).


ويتكون الانقسام الاختزالي في معظم النباتات من انقسامين متتاليين ينتج عنهما أربع أنويه (أمشاج) في خلية الأم المنقسمة، ففي الانقسام الاختزالي الأول تنصف الصبغيات، أما الانقسام الاختزالي الثاني فهو انقسام غير مباشر يظل فيه عدد الصبغيات كما هو دون تنصيف كما نتج عن الانقسام الأول، ويتم الانقسام الاختزالي في مراحل أو أطوار متتابعة .

أ				
ب				
الطور النهائي الأول (Telophase I)	الطور الانفصالي الأول (Anaphase I)	الطور الاستوائي الأول (Metaphase I)	الطور التمهيدي الأول (Prophase I)	الطور البيئي (Inter phase)
تتكون مجموعتين من الكروموزومات عند كل قطب، وتبدأ الخلية في الانقسام من المنتصف لينتج خليتين بكل منهما نصف عدد الكروموزومات (الأحادي).	ينفصل كل زوج كروموزومي عن بعضهما البعض ويتحرك كل منهما إلى القطب المقابل. يتحقق اختزال عدد الكروموزومات إلى النصف في كل خلية.	يظهر كل زوج كروموزومي متماثلين متشابهين بواسطة نقاط التقاطع. كما تظهر مصطفة في منتصف الخلية ومتصلة بخيوط المغزل.	تظهر الكروموزومات اقصر واسمك. وتكون على هيئة أزواج متماثلة. وكل زوج يعرف بوحدة رباعية الكروموزوم (Tetrads). وتحدث ظاهرتي الاقتران والعبور الوراثي.	بناء ومضاعفة الحامض النووي (DNA replicates).
أطوار الانقسام الاختزالي الأول في الخلية النباتية. (أ): رسم تخطيطي. (ب): صور بالمجهر الضوئي للانقسام كما يحصل في نبات السوسن [Lily (<i>Lilium regale</i>)].				




خلايا بها العدد الأحادي
(Haploid number)

المصبلة النهائية أربع خلايا (أشباح) بكل منها العدد الأحادي للكرموزومات.




الطور النهائي الثاني
(Telophase II)

تتكون نواة عند كل قطب وتبدأ الخلية بالانقسام إلى خليتين.




الطور الانقسامي الثاني
(Anaphase II)

تتفصل كروماتيدات كل كروموزوم، وتحرك كل منهما في اتجاهين متعاكسين نحو قطبي الخلية.



الطور الاستوائي الثاني
(Metaphase II)

تصطف الكروموزومات في المستوى الاستوائي للخلية، وتظهر مصبلة بخطوط المغزل.



الطور التمهيدي الثاني
(Prophase II)

تزيد الكروموزومات في القصر والسبك.

أطوار الانقسام الاختزالي الثانية في الخلية النباتية. (أ): رسم تخطيطي. (ب): صور بالمجهر الضوئي.

الانسجة النباتية Plants tissue

تتجمع العديد من الخلايا لتكوين النسيج النباتي **plant tissue** الذي يعرف بأنه مجموعة من الخلايا لها نفس الاصل وتشارك في وظيفة أساسية معينة، ولا يمكن لهذه الانسجة أن تعيش مستقلة، بل تعتمد في حياتها على باقي الأنسجة، إذ تتجمع مجموعة من الانسجة لتكون ما يعرف بالأعضاء التي تكون بدورها جسم النبات.

وفي النباتات البسيطة جسم النبات يتكون من خلية واحدة تقوم بجميع وظائف الحياة، كما في البكتريا والكثير من الطحالب . أما في النباتات الارقي فيتتركب جسم النبات من عدد من الخلايا المتشابهة شكلاً ووظيفة كما في طحلب باندورينا . اما في النباتات الزهرية فيتتركب جسم النبات من ملايين الخلايا المختلفة في الشكل والوظيفة

تصنيف الانسجة النباتية Classification of plant tissues

هناك تصنيفات متعددة للأنسجة النباتية وسنقتصر في دراستنا على تصنيف الانسجة النباتية اعتماداً على النشاط والانقسام، واستناداً الى ذلك تصنف وتقسّم الانسجة الى :

أولاً : الانسجة المرستيمية Meristematic tissues


الانسجة المرستيمية هي انسجة تتكون من خلايا ذات قدرة على الانقسام والنمو ، ولهذا فهي توجد في مناطق النمو بالنبات. تتميز الخلايا المرستيمية بالصفات التالية :

- 1 - خلايا قابلة للانقسام .
- 2 - خلايا صغيرة الحجم رقيقة الجدران.
- 3 - المحتويات الحية كثيفة والفجوات قليلة وصغيرة منتشرة في السايوتوبلازم.
- 4 - ذات نواة كبيرة نسبياً.
- 5 - البلاستيدات بحالة بدائية proplastids وعناصر الشبكة الاندوبلازمية قليلة.
- 6 - خلايا مترابطة لا توجد فيها مسافات بينية وان وجدت فتكون غاية في الضيق.
- 7 - تكون الخلايا متماثلة الابعاد مربعة او مضلعة او مستديرة.
- 8 - المحتويات الايضية من نشأ وبلورات تكون معدومة.

عند انقسام الخلايا المرستيمية تعطي نوعان من الخلايا

الاولى : تسمى الخلايا المولدة او الانشائية initial cells التي تبقى بحالة مرستيمية بشكل دائم. والثانية : سميت بالخلايا المشتقة derivative cells وهي خلايا تتحول الى خلايا بالغة أو ناضجة mature cells وتفقد خاصية الانقسام، وتدخل هذه الخلايا في مرحلتين متميزتين وهي الكبر في الحجم extension التي تحدث فيها تغيرات كيميائية وشكلية ووظيفية تنتهي بمرحلة التمايز أو التشكل Differentiation حيث تأخذ الخلية الشكل النهائي الذي يتلائم مع وظيفتها حسب نوع النسيج البالغ المكونة له.

وتستطيع الخلايا المتميزة جزئياً أو البالغة وتحت ظروف معينة أن تستعيد حالتها المرستيمية بعملية معاكسة لعملية التمايز Dedifferentiation كحالة نشوء الكامبيوم الوعائي بين الحزم والكامبيوم الفليني والمرستيمي الموجود في البراعم العرضية.




الخلايا المرستيمية لقطاع طولي في جذر البصل


تقسيم الانسجة المرستيمية حسب موضعها في جسم النبات.

تقسم الانسجة المرستيمية في هذه الحالة الى الاقسام التالية :

1 - أنسجة مرستيمية قمية Apical meristems وهي مرستيمات ابتدائية توجد في قمم السيقان والجذور واحياناً الأوراق ويطلق عليها القمم النامية Growing points تنقسم خلاياها بمستويات مختلفة ، يؤدي نشاط هذه المرستيمات الى الزيادة الطولية في الجزء النباتي.




رسم تفصيلي لقطع طولي في القمة المرستيمية لساق نبات زهرة العمد.




رسم لمقطع لقطع طولي في القمة المرستيمية لساق نبات زهرة العمد.

2 - المرستيمات الجانبية Lateral meristems وهي مرستيمات توجد في مواقع جانبية في محور الجزء النباتي الذي توجد فيه مثال ذلك الكامبيوم الوعائي Vascular cambium والكامبيوم الفليني Cork cambium or Phellogen تنقسم خلاياه الرئيسية بمستويات موازية للسطح القريب منها و ينشأ عن نشاطها الزيادة القطرية والزيادة في سمك العضو النباتي.


3 - المرستيمات البينية Intercalary meristems عبارة عن مرستيمات ابتدائية وتوجد بين انسجة بالغة مستديمة بعيداً عن القمة النامية كتلك التي توجد في قواعد الأوراق أو فوق العقد في سيقان نباتات ذوات الفلقة الواحدة أو قواعد السلاميات كما في نباتات الحشائش يعتبر عمل هذه المرستيمات متمم لعمل المرستيمات القمية حيث أنها تساهم في اعطاء الطول النهائي للسلاميات وكذلك تعطي الحجم والشكل النهائي لكثير من التراكيب النباتية كالأوراق والأزهار والثمار.




منطقة الانقسام والاستطالة والتمايز



المنطقة المرستيمية لبرعم جانبي



المرستيمات البينية




شكل يوضح تمايز المرستيم الاولي الى عدد من المرستيمات

أنواع من الانسجة المرستيمية

ثانياً: الأنسجة الدائمة Permanent tissues :


انسجة مكونة من خلايا توقف فيها الانقسام الفعال وأصبحت متميزة وتكيفت لأداء وظائف معينة اخرى غير الانقسام مثل الخزن كما في الخلايا البرنكيمية والنقل كما في الخشب واللحاء وهناك تقسيمات او تصانيف متعددة لهذه الانسجة اعتمدت على اساسيات مختلفة فمنها ما يعتمد على التشابه بالتعقيد ومنها ما يعتمد على المنشأ ومنها ما يعتمد على اساس الوظيفة .

وفيما يلي التصنيف المعتمد على تقسيمها تبعاً للوظيفة الى ثلاث انظمة اساسية :
 ✓ **النظام النسيجي الضام Dermal tissue system** ويشمل جميع الانسجة التي تحيط بجسم النبات كاللبشرة بالنسبة لأعضاء ذات النمو الابتدائي واللبشرة المحيطة Periderm بالنسبة لمعظم الاعضاء التي تعاني تغلط ثانوي كالسيقان والجذور المعمرة.




جزء من قطاع عرضي في ورقة نبات اللوز.

سلخنة من بشرة ساق نعب السكر.




سلخنة من بشرة ورقة نبات القرنفل.


✓ النظام النسيجي الوعائي Vascular tissue system و يشمل جميع انسجة الخشب واللحاء الموجود في جسم النبات سواء كان ابتدائي او ثانوي.



رسم تفصيلي لحزمة وعالية مركزية الخشب من قطاع عرضي في ساق نبات البوليبوديوم.






رسم تفصيلي لحزمة وعالية مركزية اللحاء من قطاع عرضي في ساق نبات الدراسينا




رسم تخطيطي لقطاع عرضي في ساق نبات السيلانتم يوضح العمود الوعائي الأولي.

✓ **النظام النسيجي الاساسي Ground tissue system** ويضم الانسجة المتبقية الواقعة بين النظامين النسيجين السابقين وهويشمل القشرة والنخاع والاشعة النخاعية في الساق والجذر والاوراق ويمثل النسيج البرنكييمي أهم مكونات هذا النظام وكذلك الكولنكييمي و السكرنكييمي الذي بدوره يشمل الالياف والسكريدات.



خلايا كولنشيمية فراغية في قطاع عرضي لساق نبات الرمرام (محتويات الخلايا غير موضحة على الرسم)


أنواع الخلايا السكرنشيمية



مجموعة ألياف من ألياف خارج اللحاء في قطاع عرضي لساق نبات عباد الشمس.

المختبر الرابع : المجموع الجذري ROOT

الجذر هو الجزء الذي ينمو عادة تحت سطح التربة ويقوم بوظيفة : التثبيت والامتصاص والتوصيل والخرن والتكاثر الخضري .



يقسم المجموع الجذري أو المجموع الأرضي و من حيث:

أ- المنشأ:

جذور أصلية المنشأ وهي الجذور التي تنشئ أصلاً من جذير البذرة وتوجد هذه في النباتات المزروعة بواسطة البذور ولهذه النباتات جذر رئيسي وجذور جانبية وجذور ليفية.

ب - تسمية الجذور:

تسمى الجذور التي يبلغ قطرها أكثر من انج بالجذور الخشبية الرئيسية والجذور التي يقل قطرها عن انج تسمى بالجذور الشعرية والجذور التي تنحصر بين انج تسمى بالجذور الثانوية الخشبية.

ج - توزيع الجذور بالتربة:

(1) جذور تنتشر أفقياً وهي الجذور الموازية لسطح التربة وتنتشر عادة أفقياً في طبقة تحت التربة في حدود 40-50 سم .

(2) جذور متعمقة وهي تتعمق الى أسفل في التربة وقد تصل إلى عدة أمتار على حسب مستوى الماء الأرضي ووظيفتها تثبيت النبات في التربة والامتصاص أيضاً.

و يمكن تقسيم الجذور الى ليفية و وتدبية وهوائية وعرضية ومتسلقة



جذور هوائية




جذور وتدبية

جذور ليفية

جذور عرضية

مناطق الجذر :

1 - القنسوة . 2- المرستيم القمي . 3- منطقة الاستطالة .




مناطق الجذر

المختبر الخامس : المجموع الخضري

المجموع الخضري أو يسمى أيضاً بالمجموع الهوائي :

وهي أجزاء النبات الموجودة فوق سطح التربة وتتكون نباتياً من الرويشة بعد انبات البذور. وتشمل الساق والأفرع والبراعم والأوراق بالإضافة إلى الأزهار والثمار.

وتختلف الساق عن الجذر في وجود العقد وهي الأماكن التي تظهر فيها البراعم سواء كانت ورقية أو زهرية والمسافة بين كل عقدتين تسمى سلامية، وتمتاز سوق النباتات بأنها صلبة وتزداد في السمك وتكون الأشجار فيما بعد ، فإذا كانت كبيرة الحجم ويوجد بقاعدتها ساق رئيسية واحدة وتعرف في هذه الحالة بالجذع واما اذا كانت تصغر عن السابقة في الحجم فتسمى شجيرات والتي قد يكون لها أيضا عدة سيقان ومتساوية تقريباً في السمك .





ويختلف تركيب ساق نبات الفلقة الواحدة عن ذات الفلقتين في خلوه من الكامبيوم وينتج عن ذلك أن ساق النخلة (جذوعها) يكون اسطوانياً ولايزيد في السمك بمرور السنين ولكن يزداد طولها وذلك بواسطة البرعم الطرفي الوحيد (الجمارة) وهو عبارة عن مجموعة من الخلايا المرستيمية الموجودة في قمة ساق وتنمو الأوراق (الجريد) من تلك الخلايا الموجودة في قاعدة البرعم الطرفي.

وفي نبات الموز تتحور الساق (ذات الفلقة

الواحدة) الى قلنسية التي تسمى بالكورمة وهي موجودة تحت سطح الأرض وتحتوي على مواد غذائية تساعد على تكوين باقى أعضاء النبات وكذلك تفيد في تكوين الخلفات التي تنمو من براعم على هذه القلقاسة. وتعتبر ساق نبات الموز الاسطوانية ساق كاذبة وهي عبارة عن التفاف قواعد الأوراق لكي تحمي بداخلها الأوراق الحديثة والعنقود الزهري وعلى ذلك يعتبر نبات الموز من أكبر النباتات الأرضية التي ليس لها ساق خشبية فوق سطح التربة وعليه اختلفت تقسيمات الفاكهة المختلفة في وضع نبات الموز مع الأشجار أم مع الشجيرات أو الأعشاب المعمرة أو النباتات الحولية. ونبات الموز لا يثمر إلا مرة واحدة يعطى فيها سوباطة واحدة يعقبها موت المجموع الخضري. لذلك يحبذ بعض العلماء وضعه تحت الأعشاب المعمرة Perennials والتي لها فترة طويلة من النمو الخضري يليها فترة قصيرة من

النمو الثمرى وبعدها موت النبات.



وتوجد عدة تحورات فى سيقان النباتات، اهمها السوق المتورقة أو السوق العصيرية الموجودة فى الصباريات . كما قد تتحور الساق الهوائية الى أشواك أو تتحور إلى محاليق كما فى العنب لتساعده على التسلق .



محاليق ساقية



ساق شوكية



ساق عصيرية

وقد توجد السوق تحت سطح الأرض كما في الدرناات (البطاطس) والأبصال والكورمات والريزومات.



tuber

درناات



bulb

ابصال



corm

كورمات



rhizome

رايزومات

المختبر السادس : الورقة Leaf

الورقة زائدة جانبية خضراء مفلطحة وهى احدى الأعضاء الهامة فى النبات وتستخدم فى تكوين الغذاء عن طريق عملية التمثيل الضوئي.

كما تستخدم فى التنفس والنتح اللذان يساعدان فى إيجاد قوة شد هائلة داخل الأوعية الناقلة للحاء فى النبات وتسبب فى معظم الأحيان دخول كميات كبيرة من الماء من التربة الى الشعيرات الجذرية كما تساعد على خفض حرارة الجو حول النباتات نتيجة لعملية النتح وتقلل من إصابة الثمار بلفحة الشمس نتيجة تضليلها ولو أنها فى بعض الأحيان يقل تلويث الثمار نتيجة لقلة الضوء المار اليها وتختلف عمر الأوراق تبعاً لنوعها فيتراوح عمر الورقة فى اشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق أقل من سنة حيث تسقط أوراقها دفعة واحدة مرة كل سنة. بينما تبقى الأوراق على الأشجار المستديمة الخضرة لمدة تمتد من سنة إلى خمس سنوات وهى لاتسقط أوراقها فى وقت واحد

بل تدريجياً على فترات. **وتحتوى الورقة الكاملة على:**

أ- عنق الورقة Petiol: وهو الذى يحمل النصل بعيداً عن الساق وقد يتورق العنق فيصبح مجنحاً كما

فى الموالح وخاصة الليمون الهندي والنانج.

ب - النصل Blade: وهو الجزء الأساسى من

الورقة ويظهر عادة منبسطةً أخضر اللون والسطح

العلوى للورقة يصبح أظلم لوناً مقارنةً بالسطح السفلى


وقد توجد شعيرات أو زغب يغطى السطح السفلى وتوجد أشكال كثيرة للنصل وتتوقف على شكل قمة

النصل أو قاعدتها وحافتها وتعريفها وإذا كان نصل الورقة قطعة واحدة أو مفصلاً بحيث لا تنفصل

عن بعضها أو عن العرق الوسطى للورقة فتعتبر الورقة بسيطة وإذا تكون النصل من عدة وريقات

منفصلة سميت الورقة مركبة ويمكن التفريق بين الوريقات عن الورقة العادية بعدم وجود براعم فى

ابطها وبوجودها فى مستوى واحد.



وقد تتحور الأوراق إلى:

- 1- **أوراق حرشفية Scale Leaves**: وهى عبارة عن أوراق صغيرة صلبة سميكة قرنية القوام وظيفتها وقاية البراعم فى فصل الشتاء.
- 2- **القنابة Bracts**: وهى ورقة يخرج من ابطها زهرة أو مجموعة من الأزهار وقد تكون القنابة ملونة فتساعد على جذب الأنظار للأزهار وقد تكون القنابة متشحمة كما فى الخرشوف.
- 3- **الأوراق المحلاقية Tensrils** وقد تتحور الورقة جميعها الى محلاق أو أجزاء منها بغرض التسلق.
- 4- **الأشواك Thorns** ويرجع ظهور الأشواك على النباتات اما لتحور حدث فى الساق أو الأوراق أو أجزائها وقد يكون الغرض من ذلك التحوير هو حماية النبات نفسه من الحيوانات الضارة أو لتقليل النتج.

وتختلف الأوراق بحسب ترتيبها على الساق باختلاف النباتات فمنها :

- أ- الترتيب المتبادل : وفيه توجد ورقة واحدة عند كل عقدة من الساق.
- ب- الترتيب المتقابل : وفيه توجد عند كل عقدة ورقتان متقابلتان .
- ت- الترتيب الدائري : وفيه توجد اكثر من ورقتين على العقدة الواحدة .




Whorled

الدائري



Opposite

المتقابل



Alternative

المتبادل

النصل : وهو التركيب الذي غالباً مايكون مسطحاً أخضر اللون .

من أنواع الأوراق بالنسبة الى أشكال النصل :


- 1- الشريطي : ويكون النصل فيه ضيقاً وطويلاً بشكل تكاد تكون حافته متوازيتين كما في الحشائش .
- 2- الرمحي : وفيه يكون النصل ضيقاً ولكنه يستدق تدريجياً باتجاه القمة كما في الدفلة .
- 3- البيضي : وفيه يكون النصل أعرض قليلاً عند القاعدة منها عند القمة كما في الفستق .
- 4- القلبي : وهو يشبه القلب كما في المشمش .
- 5- الملعقي : وفيه تكون الورقة أعرض عند جزئها العلوي منها عند القاعدة كما في الاقحوان .
- 6- ابري : وفيه تكون الورقة طويلة ورفيعة واسطوانية الشكل وذات نهاية حادة كما في الصنوبر .



أشكال النصل

ومن أنواع الأوراق بالنسبة الى شكل قمة الورقة :

1 - الحادة 2- المستديرة 3- المشطورة 5- المستدقة .



acuminate

emarginate

obtuse

acute

المستدقة

المشطورة

المستديرة

الحادة

أما بالنسبة لقاعدة الورقة فمن أنواع الأوراق :

1 - السهمية 2- المزراقية 3- الحادة 4 - المستديرة 5- اذنية 6- القلبية.



acute

hastate

sagittate

الحادة

المزراقية

السهمية



cordate

auriculate

rounded

القلبية

الاذنية

المستديرة

وبالنسبة لحافة نصل الورقة يمكن تقسيم الأوراق الى :


1 - مفصصة 2- ملساء 3- مقروضة 4- مسننة مضاعفة 5- مسننة .



التعرق في الورقة :

تمثل العروق **Viens** الحزم الوعائية في النصل والتي تتفرع من سويق الورقة أو العرق الوسطي **Mid-Rib** ، تعمل العروق بالاضافة الى نقلها للمحالييل والمواد الغذائية على اعطاء النصل القوة اللازمة . ويعرف نظام توزيع العروق خلال نصل الورقة بالتعرق .

والتعرق يكون على نوعين : متوازي وشبكي ويوجد منه الريشي والكفي .



تعرق شبكي كفي

تعرق شبكي ريشي


تعرق متوازي

الأوراق البسيطة والأوراق المركبة :

الورقة التي لها نصل واحد تسمى ورقة بسيطة. مثل أشجار التفاح والبلوط ومختلف النجيليات وأنواع عديدة أخرى من النباتات والتي لها أوراق بسيطة. أما الورقة التي لها أكثر من نصل فتسمى ورقة مركبة. وأنصال الورقة المركبة تسمى الوريقات


تقسم الاوراق بحسب عدد الانصال الى :

- 1- بسيطة .
- 2- مركبة كفية : ثنائية أو ثلاثية .
- 3- مركبة ريشية : أ- أحادية (زوجية أو فردية) . ب - ثنائية ج- ثلاثية .



ورقة مركبة كفية

ورقة بسيطة



مركبة ريشية

ثلاثية

مركبة ريشية

ثنائية

مركبة ريشية

احادية زوجية

مركبة ريشية

احادية فردية

-البراعم Buds:

البراعم هي مبادئ تكوين نموات خضرية أو زهرية أو هي نموات خضرية أو زهرية في حالة نشأتها.

نشاط :

- قم بجمع مجموعة من الأوراق لنباتات مختلفة وتعرف على شكل النصل وحافته وقاعدة الورقة وقمة الورقة ونوع التعرق وما إذا كانت بسيطة أم مركبة . ثم دون ذلك في دفترك مع الرسم .
- ابحث عن انواع البراعم ثم دونها في دفترك.


الزهرة

The Flower الزهرة

الزهرة هي العضو المسؤول عن عملية التكاثر في النباتات المزهرة (مغطاة البذور). وتتمثل الوظيفة البيولوجية للزهرة في أنها تعمل على دمج حبوب اللقاح المذكرة مع البويضة المؤنثة من أجل إنتاج البذور والابواغ وبالتالي التكاثر وبقاء النوع .

تختص الزهرة بحمل المحيطات الأساسية والغير أساسية الخاصة بالتكاثر الجنسي وإنتاج ثمار وبذور لحفظ النوع بعد ذلك، وتنشأ الزهرة من ابط ورقة يقال لها قنابه . وتختلف الأزهار في النباتات المختلفة من حيث الحجم والشكل كما تختلف في وجود الأعناق فتوجد أزهار ذات أعناق (معنقة) وأخرى بدون عنق (جالسة) وقد توجد الأزهار مفردة أو توجد الأزهار متجمعة على شمراخ وتعرف بالنورة inflorescence.

وتعد الأزهار مهمة من الناحية التصنيفية مقارنة بالصفات الخضرية وذلك لأنها تمتاز بصفات ثابتة أمام التغيرات البيئية الطارئة ولا تتأثر كما هو الحال بالنسبة للاجزاء الخضرية وكما انها تختلف بأشكالها وحجومها.



تركيب الزهرة

أجزاء الزهرة Floral parts


تحمل الزهرة على تركيب يعرف بالحامل الزهري وتتسع نهاية الحامل لتكون تركيب يعرف بالتخت وتحوي الزهرة النموذجية أربعة حلقات تمثل الأعضاء الزهرية وهي كالآتي ابتداءً من المحيط الخارجي الى المركز كالآتي :

1. الكأس calyx : هو الحلقة الخارجية ويتكون من أوراق محوره تدعى بالسبلات وتكون خضراء عادةً وظيفتها حماية الزهرة.

2. التويج corolla : ويتكون من أوراق تدعى بالبنتلات وتكون ملونة وظيفتها جذب الحشرات عادة، تدعى حلقتي الكاس والتويج بالغلاف الزهري، ان اوراق الغلاف الزهري أما ان تكون منفصلة أي سائبة أو متحدة وقد يتحور الغلاف الزهري الى شعيرات وفي حالة فقدان الغلاف الزهري تكون الزهرة عارية.

3. الأسدية stamens : وهي الأعضاء التكاثرية الذكرية وتحمل حبوب اللقاح وتتألف السداة من خويط ينتهي بجسم منتفخ يسمى المتك ويحوي المتك على فصين كل منهما يحتوي على كيسين تتكون فيهما حبوب اللقاح pollen grains .

4. المدقة أو المدقات pistils : وتحتوي الزهرة على مدقة واحدة أو العديد من المدقات والذي يحتل مركز الزهرة والمدقة تبنى من ورقة أو أوراق محورة تدعى بالكرابل Carpels وتتألف المدقة من جزء قاعدي منتفخ يدعى بالمبيض ovary يحتوي داخله على بويضات ovules والتي عند نضجها تكون البذرة seed يتصل بالمبيض من الأعلى تركيب خيطي او شبه خيطي يدعى بالقلم style ينتهي بتركيب متخصص لإستلام حبوب اللقاح يدعى بالميسم stigma .



اخصاب البويضة داخل مبيض الزهرة

🌱 نشاط :

- قم بجمع مجموعة من الازهار التي تنمو ضمن الرقعة الجغرافية للكلية وتعرف على اجزائها .

البذرة والثمرة


Seed and Fruit

البذرة Seed

يبدأ تكوين البذرة بعد تمام عملية الإخصاب وبعد تكوين البويضة الملقحة (Zygote) يبدأ نمو البذرة وتكوين أجزائها المختلفة ثم تبدأ في تخزين المواد الغذائية حتى اكتمال نموها.

تتكون البذرة من الأجزاء الآتية:

- 1- الجنين :** يعتبر الجنين منشأً لنبات جديد ويتكون غالباً نتيجة لاتحاد الكاميطة المؤنثة والمذكرة . ويتركب الجنين من السويقة الجنينية السفلى، الفلقات، السويقة الجنينية العليا والرويشة والجذير.
- 2- الأنسجة المخترنة :** تخزن البذور الغذاء إما في الاندروسبرم (السويداء) وتسمى البذور الاندوسبيرمية أما الغير اندوسبيرمية يخزن الغذاء فيها داخل الفلقات .



3- الأغلفة البذرية : وهي أغلفة البذرة أو بقايا الاندوسبرم

تركيب بذرة القمح


ويتكون غلاف البذرة من أغلفة البويضة وهي تتكون من غلاف أو اثنين عادة وغالباً ما يتصلب الغلاف الخارجى (القصرة) ويصبح ذو لون غامق فى حين يظل الغلاف الداخلى شفاف رقيق ويبقى الاندوسبرم داخل الغلاف الداخلى مكونة فى بعض الحالات طبقة واضحة حول الجنين.

التكاثر البذرى:

هو إنتاج فرد أو نبات جديد عن طريق جنين البذرة والناتج عن عمليتي التلقيح والإخصاب. وتستخدم البذرة كوسيلة إكثار أساسية ولكن بالنسبة لأشجار الفاكهة فإنه قد لا ينصح باتباع التكاثر الجنسي حيث أن معظم أشجار الفاكهة خلطية التلقيح مما يعنى أنها خليط وراثي أي تختلف وراثياً فيما بينها، حيث أنها عند تكوين حبوب اللقاح والبويضات من خلال الانقسام الاختزالي يحدث الانعزالات الوراثية والعبور ومن ثم تختلف الكاميطات الناتجة عن بعضها فى التركيب الوراثي والذي يؤدي إلى إنتاج نسل يختلف كل فرد فيها عن الآخر، أو غير متماثلة.

تكوين البذور والثمار:

بعد تكوين الجنين وتكوين غذائها المدخر تنمو البويضة بتأثير الاخصاب وتتكون منها البذرة كما تتكون الأغلفة البذرية على اختلاف أنواعها من أغلفة. ولا تقتصر النتيجة الحاصلة من الاخصاب على تكوين البذرة من البويضة بل يسري تأثير الاخصاب وينبه كل أجزاء المبيض الذي عندما يتم نضج جميع البذور بداخله تتكون منها ثمرة النبات ويتكون من جداره الغلاف الثمرى Pericarp إذ تنشأ الثمرة من مبيض الزهرة غالباً بعد إتمام عملية الاخصاب والتي ينشأ من تأثيرها أحياناً نمو الغلاف الزهري أو التخت وبذلك قد يدخل بعض هذه الأجزاء فى تركيب الثمرة وبعد حصول الاخصاب عادة يسقط التويج والطلع أو يذبلان وقد يسقط الكأس أحياناً ولكن المبيض يبقى فى كل الأحوال وينمو نمواً كبيراً ليسمح للبذور الموجودة بسرعة النمو أما الميسم والقلم فيذبلان وقد يبقى لهما أثر بأعلى الثمرة ووظيفة الثمرة هى المحافظة على البذور ومدّها بالغذاء حتى يتم نموها ومساعدتها على الانتشار.



مراحل تكوين الثمرة من مبيض الزهرة


العقد البكري Parthenocarpy

قد تنمو الثمرة من المبيض بدون إخصاب كما يحدث فى البرتقال أبوسرة والموز والعنب البناتى والجوافة البناتى والليمون العجمى أو البناتى والاناناس، والثمار البكرية تكون عادة لابذرية أى عديمة البذور Seedless إلا أنها قد يتكون فى بعضها أحياناً بعض البذور الناتجة عن نمو بويضات غير مخصبة ويطلق على حالة تكوين البذور من بويضات غير مخصبة اصطلاح Parthenogenesis

(التوالد العذري) كما يحدث فى ثمار البرتقال أبوسرة ويجب أن ننوه هنا بأن الثمار اللابذرية ليس من الضروري أن تكون بكرية ولكن قد تحدث هذه الظاهرة نتيجة ضمور الجنين وتلاشى الأجنة بعد تكوينها بواسطة التلقيح والاصصاب مثل بعض أصناف العنب والكمثرى والتفاح.

نشاط :

1- ارسم مراحل تكون الثمرة .




(c) 2013 Kelly Finan

2- اجمع عينات من البذور وتعرف على اجزائها وتراكيبها الداخلية قبل وبعد الانبات.



المختبر التاسع : النباتات البذرية

معظم النباتات التي نراها حولنا في البيئة هي نباتات بذرية وتعد أرقى النباتات وأكثرها انتشاراً على سطح الأرض، كما يعيش معظمها على اليابسة وتتميز النباتات البذرية بتكوينها بذوراً وتحوي البذور على جنين (نبات صغير) وكمية من الغذاء تختلف حسب نوع البذرة، وقد تكون هذه البذور محمية داخل الثمار (مغطة البذور) أو موجودة داخل مخاريط تحميها أوراق حرشفية (معراة البذور).





الصنوبر – معراة البذور



مغطية البذور

نشاط :

- احضر مجموعة من النباتات البذرية و صنفها.

المختبر العاشر : تأثير البيئة على التركيب المظهري والتشريحي للنبات

أ -النباتات المائية :

في البيئة مغمورة في المياه الراكدة للترع والمصارف وكمثال عليها نبات الailوديا فان الظروف التي تواجهها هذه النباتات هي:

- 1- نقص الأكسجين المذاب.
- 2- قلة الضوء.
- 3- التيارات المائية.



التكيف :

1 - الجذر ضعيفة لعدم الحاجة إليها في تثبيت النبات.

2 - الساق خضراء مرنة حتى لا تتحطم بفعل التيارات المائية.

3 - تحتوى على غرف هوائية في الداخل لتخزين جزء من

الأكسجين الناتج من عملية البناء الضوئي واستخدامه في التنفس ومساعدة النبات على الطفو في المنطقة المضيفة من المياه.

4 - الأوراق شريطية صغيرة الحجم حتى لا تتمزق بفعل التيارات المائية وليس لها أعناق (جالسة) ليكون اتصالها بالساق قوي.

ب -النباتات الصحراوية:

تتميز النباتات الصحراوية بقدرتها على النمو في ظروف المناخ الجاف، ولهذا يلاحظ أن معظمها عبارة عن نباتات شوكية صغيرة الأوراق كالصبار أو أعشاب أو شجيرات قصيرة.

التكيف :

1 - التفاف الأوراق بحيث تتعرض أطرافها فقط لأشعة الشمس.

2 - خزن المياه في الأوراق والسيقان مثل الصبار.

3 - امتداد الجذور لأعماق كبيرة في الأرض للوصول إلى الماء الجوفي كالنخيل.

4 - بعضها تتميز بوجود طبقة شمعية على أوراقها تحول دون تبخر الماء منها.

5 - وهب الله النباتات الصحراوية أشكالاً ظاهرية تحميها من الرياح حيث خلقها مكورة، أو بمجموع خضري قصير، وأوراق حرشفية كما في نبات الكازوارينا.

6 - حمى الله بعض النباتات الصحراوية من الإضاءة الشديدة بوجود فقاعات مائية، أو بلورات ملحية و شعيرات ذهبية فضية لامعة تعكس الضوء عن النبات، كما توجد غرفة غائرة للثغور مغطاة بالشعيرات العاكسة للضوء والحرارة .

7 - ولا يقل التشريح الداخلي لأوراق وسيقان النباتات الصحراوية إعجازاً عن الشكل الظاهري، حيث توجد كميات كبيرة من الأنسجة القوية المدعمة السكرنكيميية تحول دون تهدل النبات في البيئة



الصبار



التين الشوكي



العاقول



الكازوارينا