Plant Taxonomy

تصنيف النبات

(عملي)

تصنيف نبات /عملي

المحاضرة الأولى

المعشب Herbarium: هي مجموعة من عينات النباتات المحفوظة (شكل ١). ويمكن أن تكون العينة من أجزاء أو النبات بالكامل: وعادة ما تكون مجففة، ملصقة على ألواح، لكن ذلك يعتمد على نوعية العينة حيث أنها يمكن أن تكون محفوظة في كحول أو أي مادة حافظة أخرى. ويمكن أن يشير مصطلح المعشبات إلى المبنى الذي يتم فيه تخزين العينات، أو إلى المؤسسة العلمية والتي تحتوي أيضا على العينات بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بها.

هناك شبه إجماع بأن المعشبات هي أول المعامل النباتية التى عرفها الإنسان ، بعد مرحلة الجمع العشوائي من البراري والحدائق ، فقد كان لازماً عليه ان يفكر في المكان الذي يحفظ فيه التي يجمعها بطريقة تسهل عليه الرجوع إليها باسرع وايسر جهد ، ومع نجاحه في ايجاد ذلك المكان بمواصفاته الممكنة يمكننا ان نقول ان ذلك كان بداية للبحث العلمي النباتي (التقليدي) الذي بدء بالفعل في أروقة المعشبات.

شكل (١) المعشب ومكان حفظ العينات النباتية الجافة

إعداد العينات المعشبية

١ـ مرحلة الجمع

وهي المرحلة التي يقوم فيها الجامع بالخروج الى البيئة الطبيعية في جو صحو (غير ممطر أو عاصف)، حاملاً ما يحتاجه لهذه المرحلة من:

أـ دفتر لتسجيل المعلومات ب-عدسات مكبرة ج-حقائب لجمع العينات

د-اداة حفر ومقص نباتات وما إلى ذلك من مستلزمات حقل بالأضافة إلى كاميرا حتى يقوم بتصوير بعض العينات النباتية في بيئتها الطبيعية . وقبل ان تمتد يده ليلتقط العينات ، عليه ان يراعي:

ان النوع الذي سيقوم بجمعه متوافر في المنطقة وفي أعمار مختلفة حتى تكون العينة التي سيختارها ممثلة قدر الامكان للنبات في مراحل نموه المختلفة وهو بادرة وهو بالغ ، بمعنى اشتمالها على كافة اجزاءه من مجموع جذري ومجموع خضري بما في ذلك اشتمالها على ازهار او ثمار ويحبذ ان تكون ناضجة (بها بذور) وان تكون خالية من الأمراض أو الاصابات الحشرية (تستخدم أكياس بلاستيك أو حقائب من الصاج محكمة الغلق لحفظ العينات من العوامل الجوية لحين الوصول بها الى المعشبة مع كتابة تاريخ ومكان الجمع بالقلم الرصاص على ورقة ترفق بهذه العينات).

عند اختيار وجمع وتجفيف العينات يجب مراعاة الدقة في اختيار العينات عند الجمع إذ يتحتم أن تشتمل العينات على الأشكال والأحجام المختلفة للاوراق كما أن جمع الأزهار والثمار والبذور له أهميته إذ تعتمد معظم المفاتيح النباتية علي الخصائص الزهرية والثمرية عند التعرف على العينات النباتية المختلفة، وحتى لا يكون هناك مجال للشك أثناء التعرف علي العينات المختلفة. ويراعي أن يتناسب حجم العينة المراد حفظها مع حجم المكبس حتى لا تبرز أجزاء منها خارج المكبس أثناء عملية الضغط ولا ينصح برش النباتات بالماء عند الجمع بهدف تأخير ذبولها حيث يساعد ذلك علي تغير الألوان أثناء عملية التجفيف. وتتطلب عملية نقل العينة من علبة العينات إلى المكبس عناية فائقة ودقيقة وتزال وتغسل أي مواد طينية أو غريبة عالقة بالجذور أو الأوراق

ويحرص علماء النبات على جمع عينات كاملة او شبه كاملة من البيئة ، بجذورها ومجموعها الخضري بما يحمل من سـيقان وأوراق و أزهار وثمار ، لأن الهيئة الكاملة للنبات تسـاعد كعلامات فارقة في التعرف على النوع ومن ثم مقارنته بالأنواع الأخرى ، فقد يتشابه نوع مع نوع آخر في العائلة الواحدة من حيث ، شكل الأوراق Leaves و الأزهار Flower والبذور Seeds وذلك من حيث لونها وحجمها وشكلها التفصيلي ، نقول يتشابه إلا أنه يختلف بقدر لا يستطيع ان يميزه إلا الخبير المتخصص ، كنظام وضـع الأوراق على السـيقان أو نظام أمتداد الجذور وما إلى ذلك من مميزات فارقة ، وهي علامات تحتاج إلى خبرة ونظرة علمية دقيقة وفاحصـة ، قد تسـتلزم في بعض الأحيان ، إسـتخدام آدوات فحص مجهرية بدءاً من العدسات المكبرة أو المجاهر البسيطة إلى المجهر الألكتروني (اشكال حبوب اللقاح) ، وهو ما ساهم بدوره في ظهور او انفصال او تمايز أنواع جديدة باسماء جديدة غير تلك الاسماء التي كانت معروفة ، فمع التقدم التكنولوجي وتطور الفكر العلمي ، بات من المألوف في عالم النبات ، تغير اسـماء بعض الانواع نتيجة لظهور علامات او تفاصـيل جديدة لم تكن معروفة من قبل ، وهو ما يثري بدوره البحث العلمي و الحصيلة العلمية المتعلقة بالرصيد النباتي العالمي بشكل عام ، وما كان يتحقق ذلك دون الرجوع إلى العينات المعشبية الدستورية .

مرحلة الحجر والفرز

قبل تفريغ العينات من أكياس الجمع أو العلب وقبل إدخالها إلى طاولة العمل في المعشـبة توضـع في فريزر تثليج لمدة ٢٤ سـاعة لقتل الآفات النباتية، يتم بعدها فرز العينات لاسـتبعاد المصـاب منها، والتأكد من خلوها تماما من أي عوالق غريبة حشرية او فطرية أو أتربة، حتى لا يؤدي ذلك إلى إنتقال الاصـابة لباقي العينات المعشـبية، ويتم غسـلها بالماء الجاري (أو نفضـها من الأتربة، دون الغسـيل) وفردها لتجف في الهواء، ثم تجمع مرة ثانية، لتصنف في مجموعات.

مرحلة الكبس

طاولة العمل يتم تجهيز المكابس الخشبية (لوحان من الخشب مقياس عالمي .٣ ×٤٥سم - وعلى بهما ثقوب للتهوية) واوراق جرائد - مطوية - واوراق كرتون لتشـرب الماء ، حيث يوضـع احد اللوحين علي الطاولة ثم يوضع طبقة من الكرتون والجرائد ، وترص العينات في طبقات تفصل بينها الجرائد او اوراق التجفيف ، على ان تفرد اوراق كل عينة فردا كاملا ، وترص طبقة اخري ، وهكذا حتى يتكون مجلد كبير من الطبقات وتوضـع الهوايات بين الطبقات وهي عبارة عن رقائق من ورق سـميك أو من

الألمونيوم المتموج السطح وتستعمل الهوايات لتوفير الحيز اللازم لحركة الهواء خلال المكبس لدخول هواء جاف دافئ وللتخلص من بخار الماء. ، ثم تغطى باللوح الخشـــبي الثاني ويربط اللوحان بالحبال للضـغط على العينات حتى تفقد محتواها المائي ومن ثم تتشـربه أوراق الجرائد. وتترك لمدة يومين في مكان جيد التهوية ، ثم يعاد تغيير الجرائد بجرائد أخرى جديدة ، وهكذا لمدة ثلاث او اربع مرات حسـب طبيعة العينات النباتية والتقدير الشـخصـي لمدى جفاف العينات ، فكلما كانت العينات النباتية عصـيرية كلما احتاجت إلى تبديل أوراق التجفيف على فترات متقاربة عدة مرات (يلجأ بعض الهواة الى ضـــغط العينات النباتية بين اوراق بعض الكتب القديمة ، ووضـــع ثقالات كقوالب الطوب عليها وهي طريقة مقبولة ولا تحتاج الى ادوات)شكل (٢)



شكل (٢) عملية كبس وتجفيف العينات النباتية

- مرحلة اعداد النموذج

بعد تجفيف النموذج بالكامل نقوم باعداد البطاقة التعريفية (شكل ٣) والتي تكون على شكل قطعة كارتون تحمل المعلومات التالية :

١- الاسم العلمي للنبات
٢- اسم العائلة
٣- اسم الرتبة
٤- مكان الجمع
٥- اسم الجامع
٦- التاريخ

وتحفظ البطاقة داخل دولاب حفظ النماذج .

(شكل ٣) البطاقة التعريفية

تصنيف نبات عملي
محاضرة ثانية

المقدمة

- من الاساسيات التي تتطلبها دراسة علم التصنيف هي المعرفة الدقيقة باعضاء الجسم النباتي والمصطلحات التي تعبر عن طبيعتها واشكالها واجزائها وترتيبها. وفي هذه الحالة فقط يصبح بالامكان تقديم وصف علمي كامل ودقيق لكل مايلاحظ فيها من التغايرات التي يفيض بها عالم الاحياء.
- لاتعطى للجذور اهمية تصنيفية كبيرة وذلك لقلة التغايرات التي تلاحظ فيها فمن البديهي كلما اخذ العضو النباتي اشكالا مختلفة كثيرة منح بذلك فرصا اوسع للمقارنة والتشخيص.
- فالصفات المعتمد عليها في التشخيص هي تلك التي تتميز بثباتها وصمودها عبر الاجيال دون ان تتغير الا بفعل التطور وتصبح موروثة ولهذاتكون للاعضاء التكاثرية في عملية التشخيص اهمية اكبر مما للاعضاء الخضرية بصورة عامة.

الجذر

- ان اصل المجموع الجذري هو الجذير الموجودة في جنين البذرة لانة يكون المحور الرئيسي لذلك المجموع والذي يعرف بالجذر الابتدائي **primary root** والذي يعطي فروعا جانبية والتي تعرف بالجذور الثانوية **secondary root**.
- الجذر: هو جزء النبات الذي ينمو غالباً تحت سطح التربة ويقوم بالامتصاص والتثبيت والخزن أحياناً.



رسم تخطيطي لبذرة الفاصوليا (x5)

مناطق الجذر:

١. القلنسوة (**Root cap**).
٢. منطقة النمو (**Growing region**).
٣. منطقة الاستطالة.(**Elongation region**)
٤. منطقة النضج (**Maturation region**).



Figure 5.3 The regions of the root-tip

تقسم الجذور بالنسبة لمنشائها الى ثلاث مجموعات:

١. جذور ابتدائية **(Primary roots)** تتميز بهذا الشكل من الجذور اغلب نباتات ذات الفلقتين وعاريات البذور وهي تنشأ نتيجة نمو جذير جنين البذرة ويعد كل مايتفرع عنها جذرا ثانويا . قد يكون:

١- وتدي **Tap root:** يوصف الجذر بانه وتدي في حالة بقاء الجذر الابتدائي ونموه يصبح هو المحور الرئيس في المجموعة الجذرية ويكون اكثرها طولا وسمكا ، كما في الباقلاء.

٢- الجذور اللحمية **Fleshy roots:**

وهي جذور سميكة ولحمية وغالباُ ما تخزن الماء والمواد الغذائية ، وتقسم حسب الشكل الى :

- (المخروطية)**Conical** : تكون القاعدة عريضة ثم تضيق الى ألسفل كما في الجزر.
- (المتكور)**Napiform** : تكون قرصية الشكل تضيق باتجاه النهايتين كما في الشلغم.
- (المغزلية)**Fusiform**: يكون الجذر متضخم عند منتصفة ويضيق تدريجيا باتجاه النهايتين كما في الفجل


Conical - Carrot
Fusiform - Radish
Napiform - Beetroot

٢- جذور ثانوية **Secondary roots** هذه فروع تنشأ من منطقة الدائرة المحيطة في الجذر الابتدائي.

٣- جذور عرضية **Adventitious roots** تنشأ من السيقان او من الاوراق وتكون بالاشكال التالية:

- ١- جذور ليفية **Fibrous roots:** تتميز بها بصورة عامة نباتات ذات الفلقة الواحدة. في هذا النظام الجذري يضمحل الجذر الابتدائي بعد تكونه بفترة قصيرة وتنوب عنه مجموعة من الجذور النحيفة متساوية تقريبا في الطول والسمك مثل الحنطة والشعير.

- ٢- جذور مساعدة:**Prop roots** تنمو من العقد السفلى للساق فوق سطح التربة وتتجه نحو الاسفل فتغور في التربة لتقوم باسناد النبات ودعمه لحمايته من الانثناءات التي قد تسببها الرياح والامطار وان الاجزاء الارضية منها تساعد في الامتصاص كما في الذرة وقصب السكر.

- ٣- جذور درنية **Tuberous root** :هذه جذور متضخمة نتيجة خزنها لمواد غذائية وهي في الاصل جذور ليفية مثل نبات الداليا ..*Dahlia* sp

- ٤- جذور هوائية **Aerial roots** تخرج من السيقان وتساعد في التسلق كما في نبات حبل المساكين ، اما في التين البنغالي تخرج من الاغصان المورقة وتتجه نحو الاسفل وغالبا ماتخترق سطح الارض فتصبح دعامة للافرع الثقيلة.
- ٥- جذور تنفسية **Aerating root** تتكون مثل هذه الجذور في النباتات التي تعيش في مستنقعات طينية رخوة رديئة التهوية.فهي تخرج عموديا فوق سطح الماء لاخذ الاوكسجين اللازم لعملية التنفس ، مثل نبات ابن سينا (الشورى)


aerial roots
جذور هوائية
pillar roots
جذور دعامية
Ficus benghalensis
نبات التين البنغالى
Avicennia officinalis
نبات ابن سينا (الشورى)
close up showing respiratory roots
منظر مكبر لمشاهدة الجذور التنفسية

نبات حبل المساكين

المحاضرة الثالثة

- السيقان واشكالها وتحوراتها

(الســاق Stem)

السيقان Stems

الساق عبارة عن المحور الرئيسى للمجموع الخضرى ويقوم بحمل الاوراق والبراعم والازهار والثمار تبدأ السيقان في التكوين داخل البذور والحبوب على هيئة الرويشة (Plumule) التي تخرج من البذور والحبوب أثناء الانبات

stem

السـاق

عقد
Node
Leaf scar
Inter-Node
بين العقدتين
البراعم
Bud
Vascular Bundle

(الســاق Stem)

وظائف الساق:

١. حمل الاوراق والبراعم والازهار والثمار، وتعريض الاوراق للضوء

٢. توصيل الماء والذائبات الممتصة بالجذور الى جميع اعضاء النبات، وكذلك نقل وتوزيع الغذاء المجهز في الأوراق والناتج من عملية البناء الضوئى الى اماكن استهلاكه في النمو أو تخزينة في اماكن التخزين.

٣. تقوم بعض السيقان بتخزين المواد الغذائية كما تتحور بعض السيقان للقيام ببعض الوظائف الأخرى مثل القيام بعملية البناء الضوئى وتقليل النتح والتسلق.

طبيعة الساق

Habits of stems:

A-Erect stem. ساق قائم



1-Herbaceous setms. عشبي

2-shrubs.

شجيرات

3-trees.



B-weak stem. السيقان الضعيفة

1-climbing stem.
ساق متسلقة

2- twining stem.
ساق ملتفة

3-prostate stem.
ساق منبطحة



بعض الصفات الاخرى للساق

Other characters of stem:

Dwarf stem

Long stem

-hollow stem

تشغل الأنسجة المنطقة السطحية فقط تاركة جوف الساق فارغاً.

كتلك التي في الفول *Vicia* والبرسيم والقمح ، والغاب *Arundo*

-solid stem.

بداخله نخاع وليس به تجويف ، مثل سيقان القطن والدورانتا والملوخية *Corchorus*

-Glabrous.

-hairy.

-prickily.

سطح الساق

ذو أشواك ذو شعيرات، أملس،

Glabrous أملس
Arundo القاب

Hairy شعرى
Helianthus عباد الشمس



Prickly شوكى
Rosa الورد

Flattened

-Angular -Cylindrical.

-Flattened



أشكال مقطع الساق

- أسطوانى Cylindrical
  - الملوخية والبرسيم والغاب
- مضلع Angular
  - اللوف والسعد والفول
- مفلطح: Flattened
  - السفندر والتين الشوكى



Branching of stem: تفرع الساق

1-dichotomous branching. تفرع ثنائي



Dichotomous branching

2-Monopodial branching: تفرع صادق المحور

تبادلي

Monopodial
(with alternate branching)

متقابل

Monopodial
(with opposite branching)

3-Sympodial branching. تفرع كاذب المحور

Hetamorphosis of stems: تحورات الساق

1- leafy stem ساق ورقية

a-phylloclades.

b-cladodes.

2-succulent stem. عصارية

3-spiny stem. شوكية

4-climbing stem. متسلقة

5-Subterranean stems. سيقان ارضية

Bulb-
Allium cepa

Rhizome
Zingiber officinale

Corm-*Colocasia*

Tuber
Solanum tuberosum

Buds براعم

A-according to the position on the plant:

حسب موقعه في النبات

1-Apical (terminal) buds

برعم رأسي (قمي)

2-Lateral(axillary).

برعم طرفي



3-Adventitious buds.

البراعم العرضية

4-Seed buds.

براعم البذرية



Peanut Seed (*Arachis hypogaea*)

حسب التطور

B-According to their development:

1-leaf buds (vegetative). 2-flower buds. 3-Mixed buds.

خضرية

مختلط

حسب الموسم

C-According to their duration:

(Morus Populus)

نبات مرس بوبيولس

حرشفية

خضرية

scales in winter

green leaves in summer.

شكل الظاهري للورقة

المحاضرة الرابعة

الجزء الاول

الشكل الظاهري للورقة

الشكل الظاهري للأوراق

موضوعات الدرس

- منشأ الورقة
- أجزاء الورقة
- قاعدة الورقة
- أنواع الأذينات
- توزيع الأوراق

الشكل الظاهري للأوراق

أهداف المحاضرة

- أن يتعرف على الطرق المختلفة لمنشأ الورقة.

- أن يتعرف الطالب على الأجزاء المختلفة التي تتركب منها الورقة.

-أن يميز الطالب بين الأنواع المختلفة للأذينات. -

-أن يتعرف الطالب على الأساليب المختلفة لتوزيع الأوراق على الساق.

-أن يدرك الطالب أهمية تحور الأوراق بالنسبة للنبات.

منشأ الأوراق: LEAF INSERTION

الشكل الظاهري للأوراق

منشأ الأوراق: LEAF INSERTION

الأوراق الجذرية
Radical Leaves

في بعض النباتات مثل **الفجل والجرجير والجزر Carrot** تكون الساق قصيرة قزمية ، وتخرج الأوراق في مجموعة فوق الجذر الوتدي قرب سطح الأرض

Carrot

الأوراق الساقية
Stem Leaves

في النباتات الأخرى مثل **الورانتا *Duranta*** و**الفيكس *Ficus*** نجد أن الأوراق تتوزع على طول محور الساق وفروعه

Duranta

أجزاء الورقة

الشكل الظاهري للأوراق

أجزاء الورقة

- الورقة زائدة جانبية خضراء مفلطحة ، تحملها السيقان عند العقد ،
- تؤدي وظائف أساسية هي البناء الضوئي والنتح والتنفس،
- تتركب الورقة من ثلاثة أجزاء رئيسية هي:

القاعدة Base، العنق Petiole، النصل Lamina.

- للورقة سطح علوي upper surface وسطح سفلي lower surface

الشكل العام للورقة



أجزاء الورقة

١ـ قاعدة الورقة Leave base

هو ذلك الجزء الذي تتصل عنده الورقة بالساق ويكون أضخم قليلا من العنق، وتقترب القاعدة من الساق حتى تكاد تلتصق وتكون معه زاوية حادة تعرف بإبط الورقة Leaf axil، الذي يساعد على حماية البراعم الإبطية الدقيقة .

قد تتمتد القاعدة لتكون غمدا يحيط بالساق إحاطة تامة او جزئية (مثل الفصيلة الخيمية كالجزر واليانسون، والفصيلة النجيلية كالقمح والذرة)

قد تكون قاعدة الورقة العادية دون أية انتفاخات مثل أورق الورانتا *Duranta*

قد تكون في بعض النباتات منتفخة قليلاً (مثل أوراق البوانسيانا أو معظم أوراق العائلة البقولية).

قد تتشحم القاعدة لغرض التخزين، أو تكون حرشفية لغرض الحماية (مثل الأوراق الحرشفية في البراعم والأبصال)



أجزاء الورقة

١ـ قاعدة الورقة Leave base

- **الأذينات Stipules**
- تحمل القاعدة في بعض النباتات زائدتين على جانبيها تعرفان بالأذينتين
- وتعرف الأوراق التي تحمل أذينات : أوراق مؤذنة ،
- وإذا خلت القاعدة من الأذينات سميت الأوراق بالأوراق غير المؤذنة.
- وتقوم الأذينات بحماية النصل والبراعم.



أجزاء الورقة

١ـ قاعدة الورقة Leave base

- **الأذينات Stipules**

أنواع الأذينات:

أذينات شعرية: Hairy stipules

كما فى أوراق الملوخية *Corchorus*
وفيها تكون الأذينات على شكل شعري أو خيطي .

أذينات ملتحمة: Adante stipules

كما فى نبات الورد *Rosa*
تلتصق الأذينات التصاقاً بسيط وقصيراً بعنق الورقة.

أذينات ورقية: Leafy stipules

كما في أوراق الفول *Vicia faba*
تبدو على شكل ورقي وكذلك في أوراق البسلة وغيرها من بعض البقوليات.

أذينات شوكية: Spiny stipules

تأخذ الأذينة أحيانا شكل شوكة
كما في نبات النبق



أجزاء الورقة

٢ - عنق الورقة Petiole

- هو ذلك الجزء من الورقة الذي يفصل بين الساق والورقة .

- توصف الأوراق التي لها أعناق **بالأوراق المعنقة**

- أما تلك التي ليس لها أعناق وتتصل مباشرة بالساق فتعرف **بالأوراق الجالسة** .

أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

- هو ذلك الجزء الأخضر المفلطح الذي يحمله العنق في طرفه ، وظيفته الأساسية البناء الضوئي ، وهو الذي يعتمد عليه النبات إعتماداً أساسياً في تكوين غذائه .
- تنقسم الأوراق حسب شكل النصل إلى:

ورقة بسيطة

نصل الورقة قد يكون قطعة واحدة غير مجزءة

ورقة مفصصة

ينقسم النصل إلى عدة أجزاء (فصوص) لا تصل إلى العرق الوسطى وتظل متصلة بالنصل الأم



ورقة مركبة

انفصل كل قسم من أقسام الورقة عن النسيج الأم

أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

١- الاوراق البسيطة Simple leaves

١- إبرية Acicular

تكون الورقة رفيعة اسطوانية كما في الصنوبر

أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

١- الاوراق البسيطة Simple leaves

٢ - انبوبية Tubular

تأخذ الورقة شكل أنبونة خضراء كما في البصل

أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

١- الاوراق البسيطة Simple leaves

٣- شريطية Linear

أوراق مستطيلة أي يزيد طولها عن عرضها ١٠ مرات كما في

القمح والشعير والذرة

أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

١- الاوراق البسيطة Simple leaves

٤- إهليجية Elliptical

تشبه الاهليليج وطولها يزيد على عرضها بـ ٢ -١.٥ مرة كما في ابو فروة



أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

١- الاوراق البسيطة Simple leaves

١- مستطيلة Oblong

تشبه الورقة الاهليليجية ولكن طولها يزيد على عرضها بـ ٣-٤ مرات مثل وريقات اللبخ



أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

١- الاوراق البسيطة Simple leaves

٥- رمحية Lanceolate

تشبه الرمح في شكله وطولها يزيد على عرضها بـ ٣-٤ مرات كما في النعناع





٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

١- الاوراق البسيطة Simple leaves

٦- بيضية Ovate

شكلها بيضي عريض عند القاعدة كما في **الدورانتا**



أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

١- الاوراق البسيطة Simple leaves

٧- قلبية Cordate

شكل القلب تقريبا قمتها مدببة وقاعدتها ذات فصين مستديري الحافة
كما في **الليلك**

أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

١- الاوراق البسيطة Simple leaves

٨- بيضية مقلوبة Obovate

شكلها بيضي ولكن عريض عند القمة كما في السنامكي

أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

١- الاوراق البسيطة Simple leaves

٩- ملعقية Spatulate

للورقة قمة متسعة تضيق باتجاه القاعدة كالملعقة كما في

الرجلة والأقحوان

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

١- الاوراق البسيطة Simple leaves

١٠- كلوية Reniform

شكلها كلكلوة وعرضها أكبر من طولها كما في النبيتة



أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

١- الاوراق البسيطة Simple leaves

١١- قرصية Peltate



٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

١- الاوراق البسيطة Simple leaves

١٢- سهمية Sagittate

شكلها كرأس الحربة، بقاعدتها امتدادان مدببان متجهان للخلف وينتجان من استمرار نمو قاعدة النصل لفترة ما كما في سهم الماء

أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

١- الاوراق البسيطة Simple leaves

١٣- مزراقية Hastate

تشبه السهمية ولكن امتدادي القاعدة يكادان في وضع عمودي على المحور الطولي للورقة كما في العليق



شكل الظاهري للورقة

المحاضرة الرابعة

الجزء الثاني

الشكل الظاهري للورقة

الشكل الظاهري للأوراق

موضوعات الدرس

- منشأ الورقة
- أجزاء الورقة
- قاعدة الورقة
- أنواع الأذينات
- توزيع الأوراق

الشكل الظاهري للأوراق

أهداف المحاضرة

- أن يتعرف على الطرق المختلفة لمنشأ الورقة.

- أن يتعرف الطالب على الأجزاء المختلفة التي تتركب منها الورقة.

-أن يميز الطالب بين الأنواع المختلفة للأذينات. -

-أن يتعرف الطالب على الأساليب المختلفة لتوزيع الأوراق على الساق.

-أن يدرك الطالب أهمية تحور الأوراق بالنسبة للنبات.

منشأ الأوراق: LEAF INSERTION

أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

٢- الأوراق المفصصة Lobed leave

فيها يكون النصل مجزأ الى عدد من الفصوص ولكنها لا تنفصل عن بعضها تماما بل تبقى متصله اي ان التفصص لايصل الى العرق الوسطي، ويتبع التفصص طريقة توزيع العروق الرئيسية بالنصل



أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

٢- الأوراق المفصصة Lobed leave

أ- ورقة ضحلة التفصص

يكون انقسام النصل غير غائر ولا يزيد عن منتصف المسافة بين حافة الورقة والعرق الوسطي

ورقة ضحلة التفصص الراحي

تتهجه الفصوص الى قاعدة النصل

ورقة ضحلة التفصص الريشي

تتهجه الفصوص الى العرق الوسطي

أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

٢- الأوراق المفصصة Lobed leave

ب- ورقة عميقة التفصص

يزيد عمق انقسام النصل على نصف المسافة بين حافة الورقة وعرقها الوسطي

ورقة عميقة التفصص الراحي

تتهجه الفصوص الى قاعدة النصل

ورقة عميقة التفصص الريشي

تتهجه الفصوص الى العرق الوسطي

أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

٢- الأوراق المفصصة Lobed leave

ج- ورقة مشرحة

يصل فيها عمق الانقسام الى العرق الوسطي تقريبا أو الى قاعدة النصل

ورقة مشرحة راحية

ورقة مشرحة ريشية

أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

3- الأوراق المركبة Compound Leave

❖فيها يصل التفصص في النصل الى العرق السطي بحيث تنفصل الفصوص عن بعضها تماما الى اجزاء مستقلة تعرف بي الوريقات Leaflet

مميزاتها

١. وجود قاعدة وتحمل أحياناً أذينتين،
٢. خروج برعم أبطي من أبطها،
٣. عدم وجود برعم طرفي لها،
٤. عدم وجود براعم في أباط وريقاتها

أنواعها

- أوراق مركبة ريشية
- أوراق مركبة راحية

أجزاء الورقة

٣ – نصل الورقة Blade (Lamina)

الأوراق المركبة

- **الراحية**
  - تخرج الوريقات جميعها من نقطة احدة في نهاية العنق
- **الريشية** ← تنتظم الوريقات على جانبي العرق الوسطي
  - **زوجية الطرف**
    - تنتهي بوريقتين متقابلتين
  - **فردية الطرف**
    - تنتهي بوريقة واحدة في طرف محورها،
  - **متضاعفة**
    - نصل الوريقات مجزأ الى عدد من الوريقات الثانويه او الرويشات



palmately compound leaf



even pinnate
e.g. *Ceratonia*


odd pinnate
e.g. *Robinia*



e.g. *Albizzia, Acacia* & *Jacaranda*

LEAF MARGIN حافة الورقة

٠٨/٠٤/٣٤

أجزاء الورقة

Leaf margin حافة الورقة

- تختلف حافة الورقة اختلافاً كبيراً من نبات إلى أخر ، وتقتصر أهم أشكال الحافة كالتالي:



١- كاملة ٢- مسننة ٣- منشارية ٤- مقروضة ٥- متعرجة ٦- شوكية

٠٨/٠٤/٣٤

قمة الورقة Leaf apex

قمة الورقة Leaf apex

- تختلف قمة النصل من نبات إلى أخر، وأهم أشكال القمة كالتالي:

١ ـ حادة ٢ـ مستدقة ٣ـ مستدقة مذنبة ٤ـ مستديرة ٥ـ غائرة



٠٨/٠٤/٣٤

قاعدة النصل Leaf base

٠٨/٠٤/٣٤

أجزاء الورقة

قاعدة النصل Leaf base

- تختلف قاعدة النصل من نبات إلى أخر، وأهم أشكالها كالتالي:

١-مستدقة ٢- مثلثة ٣- مستديرة

٤- سطحية ٥- قلبية ٦- قرصية ٧- مثقوبة



٠٨/٠٤/٣٤

تعرق الورقة Leaf venation

تعرق الورقة Leaf venation

يتخلل النصل جهاز توصيلي لنقل الماء والأملاح وكذلك العصارة المجهزة كما يعمل على تدعيم أجزاءه وتعرف وحدات هذا الجهاز بالعروق،

يوجد نوعان من التعرق : تعرق مفتوح وتعرق مغلق

٠٨/٠٤/٣٤

أجزاء الورقة

تعرق الورقة Leaf venation

تعرق مفتوح

لا تتشابك العروق ولا تتصل ببعضها بل تنتهي اطرافها عند حافة الورقة

تعرق فردي

يدخل الورقة مسار ورقي واحد يكون عرقا وسطيا واحدا غير متفرع

يتكون من حزمة وعائية واحدة



الصنوبر

تعرق ثنائي الشعبة

يدخل النصل عرق واحد يتفرع الى فرعين ثم يتكرر هذا عدة مرات متتالية



كزبرة البئر

Dichotomous

تعرق الورقة Leaf venation

التعرق المغلق

تتشابك العروق وتتصل ببعضها البعض وينقسم الي:

أ- تعرق متوازٍ

يمثل النوع الشائع في ذوات الفلقة الواحدة

ب- تعرق شبكي

يمثل النوع الشائع في ذوات الفلقتين

تعرق متوازي طولياً



تعرق متوازي عرضياً



تعرق شبكي ريشياً

تعرق شبكي راحياً

التباين الورقي Heterophylly

٠٨/٠٤/٣٤

التباين الورقي Heterophylly

- يحمل كل نبات نوع واحد من الأوراق، بيد أن هناك نباتات تحمل اكثر من نوع من الأوراق وتعرف هذه الظاهرة بالتباين الورقي. ويعزى التباين الورقي إلى ما يلي:

١- تباين ظروف الوسط : كما في النباتات المائية حيث يحمل نبات حوذان الماء نوعين من الأوراق، اوراق مغمورة مجزأ نصلها إلى أجزاء رفيعة وأوراق طافية عريضة النصل قليلة التجزأ.

٢- تباين ورقي مرتبط بمراحل التكوين: كما في نبات الكافور حيث يختلف شكل الأوراق باختلاف وقت تكوينها، فالأوراق الأولي على الجزء السفلي من النبات تبدو جالسة بيضية، أما الأوراق البالغة العليا فتبدو رمحية معنقة.

٠٨/٠٤/٣٤

أنواع الأوراق Kinds of leave

أنواع الأوراق Kinds of leave

١- الأوراق الخضرية	٢الأوراق البذرية (الفلقية)	٣- الأوراق الأولية
وهي الأوراق العادية التي يحملها النبات وتقوم بالبناء الضوئي	التي توجد في أجنة البذور وتقوم باختزان الغذاء	الأوراق التي يكونها المجموع الخضري في حالة الإنبات الأرضي





أنواع الأوراق Kinds of leave

٤- الأوراق الحرشفية	٥- القنابات	٦- القنيبات
أوراق غير خضراء جالسة وظيفتها الحماية كحماية البراعم الشتوية	الورقة التي تخرج من أبطها زهرة وتكون حرشفية او خضرية	وهي أوراق زهرية اصغر من القنابات وتوجد على عنق الزهرة



أنواع الأوراق Kinds of leave

٧- أوراق زهرية

- هي السبلات والتبلات ووظيفتها حماية الأسدية والكرابل



تحورات الأوراق Metamorphosis of leave

تحورات الأوراق Metamorphosis of leave

وظيفة الورقة الأساسية هي القيام بعملية البناء الضوئي . إلا أن شكل الورقة سواء كلها أو أجزاء منها قد تتحور في بعض النباتات لتأدية وظائف خاصة ، واهم هذه التحورات:

١- تحور الورقة أو أجزاؤها إلى محاليق:

- تحور الورقة إلى محاليق للتسلق كما في نبات حمام البرج حيث تكبر الأذينتان في الحجم لتؤديا وظيفة التمثيل الضوئي عوضاً عن الورقة المتحورة.

– تحور الوريقات العليا في الورقة المركبة إلى محاليق للتسلق ، كما في نبات بازلسياء الزهور، في هذا النبات تكبر الأذينات وتصبح ورقية لتؤدي وظيفة التمثيل الضوئي بينما تظل الوريقات السفلى خضراء غير متحورة .



تحورات الأوراق Metamorphosis of leave

٢ – تحور الورقة أو أجزاؤها إلى شوكة:

تتحور الأوراق أحياناً إلى أشواك من أجل الحماية، أو لاختزال االسطح الناتح للورقة.

حيث تتحور الورقة كاملة إلى شوكة

او تتحول قمتها فقط،

وقد تتحور الأذينات إلى أشواك كما في النبق والسنط ، وهنا تظل الورقة خضراء كما هي ويستدل عليهم بوجود شوكتين تحت عنق الورقة.

تحورات الأوراق Metamorphosis of leave

٣– تحور الأوراق إلى أعضاء عصارية:

تتحور الأوراق في بعض النباتات إلى أعضاء متشحمة نتيجة اختزانها للماء أو المواد الغذائية . مثال ذلك

أوراق الأبصال التي تختزن فيها مواد غذائية مدخرة ،

وأوراق الرطريط ، والغاسول وهما من لنباتات الصحراوية، متشحمان إختزنهما الماء .

تحورات الأوراق Metamorphosis of leave

٤- تفلطح عنق الورقة:.

يتفلطح عنق الورقة في بعض النباتات ويصبح مشابها لنصل الورقة ويقوم بوظائف الورقة، ويصحب هذا التحور اختزال في نصل الورقة كما في نبات أكاسيا ساليجنا الذي تسقط فيه الوريقات في النباتات البالغة ويبقى العنق الورقي، وذلك لاختزال سطح الورقة



تحورات الأوراق Metamorphosis of leave

٥- تحور الورقة لتؤدي أغراض التغذية:

تتحور الأوراق في بعض النباتات إلى أشكال خاصة لتؤدي وظيفة تغذية ومن أمثلتها النباتات آكلة الحشرت، التي تتخصص في اجتذاب الحشرات واقتناصها وهضمها ثم امتصاص نواتج الهضم. وتتميز هذه النباتات بضعف مجموعها الجذري، ومن أمثلتها نبات الجرة ونبات الدرويسيرا.

خناق الذباب Dionaea

نبات الدرويسيرا

نبات الجرة Nepenthes

توزيع الأوراق على الساق

توزيع الأوراق على الساق

أ - ترتيب متبادل

تخرج كل ورقة من عقدة مستقلة ، والورقة التي تليها تخرج من عقدة أخرى فوقها حتى لا تظل بعضها بعضاً مثل الفول والملوخية

ب – ترتيب متقابل

عند كل عقدة تخرج ورقتين متقابلتين كما في نبات الياسمين الزفر.

ج – ترتيب سواري

تخرج الأوراق من العقد في محيطات ، وفي محيط ثلاثة أوراق أو أكثر موزعة حول الساق عند العقد كما في نبات الدفلة .



الازهار

المحاضرة الخامسة

المحاضرة الخامسة

Flower الزهرة

الزهرة عبارة عن غصن تحورت للقيام بعملية التكاثر وتنشأ الزهرة كما ينشأ اي غصن من برعم خاص يقع في ابط ورقة صغيرة الحجم تعرف بالقنابة

القنابة Bract: الورقه الموجود فى إبطها الزهرة

وتعتبر الزهرة من الصفات المظهرية المهمة المعتمدة في تشخيص وتصنيف النباتات ويمكن تقسيم هذه الصفات بالاعتماد على الأعضاء التكاثرية (الذكرية والانثوية والوضع المشيمي)والغلاف الزهري (اشكال وترتيب الكاس والتويج) وكذلك النظام الزهري سواء كانت الازهار بسيطة او نورة

اجزاء الزهرة :

تتكون الزهرة النموذجية من اربع حلقات من التراكيب التي تحمل على ساق يعرف بالحامل الزهري الذي يتسع ليكون التخت ويطلق على اجزاء الزهرة بالمحيط الزهري (شكل ١) ويتكون من

أ- الغلاف الزهري ويشمل :

الكاس:Calyx

هو المحيط الأول من جهة الخارج المحمول على التختويسمى الكاس بالكأس السبلى:Sepaloid عندما تكون السبلات خضراء. والوظيفة الرئيسية هنا للكأس حماية المحيطات الزهرية الأخرى قبل تفتح الزهرة،والمساهمة في عملية التركيب الضوئي وقد يكون للسبلات وظائف أخرى كجذب الحشرات عندما يكون الكاس ملون فيسمى كأس بتلى:Petaloid مثل نبات التيوليب.

التويج:Corolla

يعتبر التويج الحلقة الثانية من المحيط الزهري وياتي بعد الكاس مباشرة ، ويتون من مجموعة من الاوراق البتلية وهو الجزء رائع المنظر، وذو الألوان المبهجة في معظم أنواع الزهور. تجذب ألوان البتلات ـ وكذلك السَبَلات الملونة ـ الحشرات والطيور التي تساعد في نشر لقاح الأزهار. تنشأ الألوان من مركبات كيميائية معينة موجودة في أنسجة النباتات ومنتشرة في جميع أجزائه، لا في البتلات أو السَبَلات وحدها، لكن وجود كميات كبيرة من الصبغيات الخضراء أو البنية في الأجزاء الأخرى يجعلها غير ظاهرة.
وتتزركش بتلات كثير من الأزهار ببقع أو أشرطة أو علامات أخرى تعمل على جذب الحشرات والطيور.

تنشأ رائحة الزهور من مواد زيتية موجودة في البتلات. وتعمل الروائح القوية مثل الألوان على جذب الحيوانات



(شكل ١) أجزاء الزهرة

التربيع الزهري

<u>التربيع الزهري</u> :ويقصد به ترتيب الاوراق الكاسية والتويجية على المحور الزهري ويعني ترتيب حوافي الاوراق الكاسية والتويجية لبعضها البعض في البرعم الزهري لكل نبات ويمكن دراسته قبل تفتح الازهار

اشكال التربيع الزهري

١- الترتيب المصراعي



٢- ترتيب ملتف او حلزوني :



٣- متراكب تصاعدي



٤-متراكب تنازلي



٥-الترتيب الكونسي

التناظر في الازهار :



١- الزهرة المتجانسة (متناظرة): هي الزهرة التي يمكن تقسيمها الى قسمين متشابهين باكثر من مستوي عمودي طولي واحد كما في الشليك



٢- الزهرة جانبية التناظر : هي الزهرة التي لايمكن تقسيمها الى قسمين متشابهين الا بعمود واحد

الجنس في الازهار :

٢- عندما تحتوي الزهرة على كل المحيط الزهري والاعضاء التكاثرية الذكرية والانثوية تسمى زهرة كاملة زهرة تامة او كاملة

٣- عندما تحتوي الزهرة على الاعضاء الذكرية فقط تسمى زهرة مذكرة

٤- عندما تحتوي الزهرة على الاعضاء الأنثوية فقط تسمى زهرة مؤنثة

٥- وعندما تكون الزهرة خالية من الغلاف الزهري تسمى زهرة عارية

٦- في حالة تواجد الازهار المؤنثة والمذكرة على نفس النبات يسمى النبات ثنائي الجنس احادي المسكن

٧- وفي حالة تواجد الازهار المؤنثة على نبات والمذكرة على نبات اخر يسمى النبات احادي الجنس ثنائي المسكن

الاعضاء التكاثرية

أولا :- الأعضاء التكاثرية الانثوية

المتاع Gynoecium :هو عضو التأنيث في الزهرة ويتألف من الكرابل. carpels

المدقة:يطلق على الوحدة السائبة من المتاع اسم المدقة وهى قد تتكون من كربلة واحدة أو عدة كرابل متحدة معا.

الكربلة: هى الوحدة البنائية الأساسية للمتاع.

لتوضيح الفرق بين المتاع Gynoecium والمدقة Pistil (الكربلة): Carpel

أنظر فى الشكل التالى (شكل ٢) :

الشكل الاول من اليسار الى اليمين يتكون من مدقة واحدة وكربلة واحدة

الشكل الثاني يتكون من ثلاث مدقات وثلاث كرابل

الشكل الثالث يتكون من مدقة واحدة وثلاث كرابل لكن الحواجز بين الكرابل ملتحمة

(شكل ٢) الفرق بين المتاع Gynoecium والمدقةPistil

الوضع المشيمى فى الازهار

المشيمة :هي عبارة عن وسادة لحمية تتصل في منطقة التدريز البطني وتتصل بها خيوط قصيرة تحمل في نهايتها البويضات Ovules وتدعى بالحبال السرية

الوضع المشيمي :هو موضع اتصال البويضات بجدار الكربلة من الداخل حيث توجد المشيمة، ويتحدد الوضع المشيمي بطريقة اتصال البويضات داخل الكرابل هل هي على حواف الكرابل أم في وسطها وهكذا ، وفيما يلي أهم الأوضاع المشيمية :

١- الوضع المشيمي الجداري Parietal:

وفية يتكون المبيض من عدة كرابل، تلتحم بحوافها فقط وبذلك تتكون غرفة واحدة فقط ذات مشيمة جدارية تلتصق عليها البويضات (تلتصق بجدار الكرابل) مثل ورد الساعة

٢- الوضع المشيمي المحوري Axile: هو الاكثر شوعا بين النباتات الزهرية ، وفي هذا الوضع تتصل جميع البويضات بمحور وسطي ناشئ من التحام حواف الكرابل البطنية وتقابلها في الوسط. وفي العادة يكون عدد المساكن مساويا لعدد الكرابل الداخلة في تكوينه كما في الطماطة

٣- الوضع المشيمي الحافي Marginal: في هذا الوضع يكون مبيض الكربلة الواحدة ناشئ من التحام حافتي ورقة كربلية وهاتان الحافتان تكونان المشيمة الحافية وتوجد البويضات على احدي هاتان الحافتين ، كما في العائلة البقولية

٤- الوضع المشيمي المركزي السائبFree central

في هذه الحالة ينمو من قاعدة المبيض محور وسطي لا يتصل بأعلى المبيض بل يظل سائبا ، وهذا النو هو امتداد لمحور الزهرة وليس له علاقة بجدار المبيض أو حواف الكرابل.

٥- الوضع المشيمي القمي Apical:

نجد هنا ان البويضة تتصل بحبلها السري من قمة المبيض (من ناحية الميسم) كما في الخروع *Ricinus communis*.

٦- الوضع المشيمي القاعدي Basal:

اما هنا نجد البويضة تخرج من قاعدة المبيض (ناحية التخت) كما في الجهنمية *Bougainvillea sp*.

وضع المتاع على التخت : يكون المتاع على ثلاثة اشكال في تخت الزهرة كما في الشكل (٣)

١- زهرة علوية يكون التخت مقعر

٢- زهرة سفلية يكون التخت محدب

٣- زهرة محيطية يكون التخت مستوي



شكل (٣) (وضع المتاع على التخت)

ثانيا :-الأعضاء التكاثرية الذكرية

الطلع :هو عضو التذكير في الزهرة ويكون من أسدية Stamens يختلف عددها وتركيبها باختلاف الأزهار، وتتركب السداة من خيط Filament ومتك Anther. ويحتوى المتك على فصين يحتوى كل واحد منهما على كيسين من حبوب اللقاح تتكون فيهما حبوب اللقاح pollen grains

وتكون الاسدية اما ملتحمة او سائبة فعندما تكون ملتحمة تاخذ عدة اشكال وكما يلي :

اشكال الالتحام : (الشكل ٤)

١- التحام الخويطات والمتوك سائبة ويكون على اشكال وكما ياتي :

أ- تلتحم الخويطات بحزمة واحدة والمتول سائبة وتسمى Monodlephous

ب- تلتحم الخويطات بحزمة واحدة وتبقى سداة واحدة سائبة وتسمى التحام على شكل حزمتين Diadelphous .

ت- اتحاد بثلاث حزم Polydelphous .

ث- اتحاد المتوك والخويطات سائبة Synegenesiou



(الشكل ٤) اشكال التحام الاسدية

النظام الزهري (النورات)

المحاضرة السادسة

المحاضرة السادسة:

النظام الزهري : النظام الزهري هو طريقة تفتح الأزهار في الغصن الزهري أو نظام ترتيب الأغصان المزهرة والأزهار التي عليها وقد يعرف النظام الزهري بأنه غصن مزهر أو قمة نباتية ساقية حاوية على ازهار .

النورات Inflorescences

النورة :هي عبارة عن تجمع مجموعة من الأزهار سوياً على محور يسمى محور النورة (شمراخ النورة)Peduncle .

وإذا حملت الأزهار علي المحور الأصلي للنورة مباشرة كانت النورة بسيطة ، أما إذا حملت الأزهار علي محاور فرعية تخرج علي المحور الأصلي للنورة كانت النورة مركبة . وقد تكون الأزهار علي المحور أما معنقة أو جالسة .

أهمية النورة :

١- تجمع الأزهار في نورة خاصة الصغيرة منها يجعلها أكثر ظهوراً للحشرات الملقحة .

٢- تجمع الأزهار في نورة خاصة الصغيرة منها يجعلها تحمي بعضها البعض .

أكبر لانتشار بذوره لحفظ النوع .

أولاً : نورات غير محدودة Racemose or Indefinite

ويتميز هذا النوع بأن التفرع صادق المحور Monopodial بمعني أن البرعم الطرفي للمحور يستمر في النمو مدة طويلة معطياً أزهاراً أو أفرعاً زهرية علي جوانبه في نظام تعاقب قمي لذا تكون الأزهار متدرجة في أعمارها ودرجة تفتحها فأصغرها سناً يكون هو أقربها من قمة المحور وأكبرها سناً يكون هو أقربها من قاعدة المحور . ويبدأ تفتح الأزهار من أسفل المحور الى أعلاه في حالة النورة طويلة الشمراخ بينما في حالة قصر المحور يكون التفتح من الخارج الي الداخل .

أنواع النورات غير محدودة النمو :-

١-العنقودية Raceme : مثل نبات حنك السبع



٢- السنبلية Spike :مثل لسان الحمل

٣- الهرية Catkin : مثل نبات الجوز

٤- الأغريضية Spadix : مثل الذرة



٥- الهامة Capitulum : مثل زهرة الشمس

٦- الخيمية Umbel

٧- المشطية Corymb: مثل الجيرانيوم



ثانياً: النورات المحدودة النمو

وفيها يكون التفرع كاذب المحور Sympodial بمعني أن البرعم الطرفي للمحور الأصلي يقف نموه بعد فترة لتحوله الي زهرة وبذلك يقف نموه ثم ينمو من أسفل الزهرة براعم تعطي فرع واحد أو أكثر تستمر في النمو لفترة ثم ينتهي كل فرع بزهرة وقد يتكرر ذلك عدة مرات فتعرف بالمركبة ـ وهنا يبدأ تفتح الأزهار بتفتح الزهرة الموجودة في نهاية المحور الأصلي أولاً ثم يتبعها تفتح أزهار الفروع الثانية ثم أزهار الفروع الثالثة وهكذا وأنواعها ما يأتي :-

١-وحيدة الشعبة Monochasium



أ- منجلية أو قوقعية Helicoid

مثل نبات الكتان

ب- عقربية أو لولبية Scorpioid

مثل نبات لسان الثور





٢-ثنائية الشعبة Dichasium

تتالف النورة هنا من ثلاثة ازهارمثل الدفلة



٣-عديدة الشعب ؛ Polychasium

الثمار والبذور

المحاضرة السابعة

المحاضرة السابعة

الثمار والبذور

الثمرة :في علم النبات هي مبيض الأزهار الناضج، وهي العضو الذي يحمل البذرة ويحميها، و بهذا فهي تشكل وسيلة تكاثر و نشر للبذور لدى النباتات المزهرة .هذا في النباتات مغطاة البذورفقط

بعد حدوث الإخصاب في الزهرة يذبل الكأس والتويج والطلع والقلم والميسم ولايبقى من الزهرة سوى مبيضها الذى يقوم باختزان الغذاء ويكبر فى الحجم وينضج متحولا إلى ثمرة بفعل هرمونات يفرزها المبيض ،ويصبح جدار المبيض غلافا للثمرة ويصبح جدار البويضة غلافا للبذرة ،وتتحلل الخليتان المساعدتان والخلايا السمتية ويبقى النقير ليدخل منه الماء إلى البذرة عند الإنبات .

قد تحتفظ بعض الثمار بأجزاء أخرى من الزهرة مثل:-

- ثمرة الرمان تبقى بها أوراق الكأس والأسدية

- ثمرة الباذنجان والبلح تبقى بها أوراق الكأس

- ثمرة القرع تبقى بها أوراق التويج

تتركب الثمرة من بذرة أوعدد من البذور وجدار الثمرة ويتكون الغلاف الثمري من ثلاث طبقات هي

١- الطبقة الخارجية Exocarp

٢- الطبقة الوسطى Mesocarp

٣- الطبقة الداخلية Endocarp

تختلف الثمار فى الأشكال والألوان والحجوم والطعوم والروائح.

تقسم الثمار عدة تقسيمات على أسس مختلفة ، ومن هذه التقسيمات:

الطريقة الأولى:

حسب الأجزاء الداخلة في تكوينها كالتالى:

أ - ثمار حقيقية (True Fruits) يدخل فى تكوينها مبيض الزهرة فقط.

ب ـ ثمار كاذبة (١) (False fruits) وهي التي يدخل اجزاء اخرى من الزهرة في تكوينها مثل التفاح إذ يدخل التخت في تكوين الثمرة مع المبيض أو الشمراخ الزهرى كمافى التين .



(١) الثمرة الكاذبة

الطريقة الثانية في تصنيف الثمار

حسب أصلها فى الزهرة:

يمكن تصنيف الثمار بالنسبة إلى عدد المبايض التي تشترك في تكوينها وطريقة اتصالها ببعضها كما يلي :

١. الثمار البسيطة :

وهي الثمار التي تتكون ـ أساساً ـ من زهرة واحدة لها مبيض واحد، سواء تكونت من كربلة واحدة أو من عدة كرابل ملتحمة.وبغض النظرعما إذا اشتركت أجزاء زهرية أخرى أم لم تشترك في تكوينها مثل التمر و التفاح.

٢. الثمار المركبة :

وتتكون هذه الثمار من عدة مبايض تنتمي إلى زهرة واحدة ـ أي من متاع واحد ذي كرابل سائبة ـ ويطلق على كل واحدة ناشئة من مبيض واحد اسم الثميرة Fruitlet

وتتجمع الثميرات المكونة للثمرة المتجمعة على تخت واحد هو تخت الزهرة التي نشأت عليها الثمرة.



مثل ثمرة التوت، التي تتكون من ثمار صغيرة متجمعة على عمود أو سويقة صغيرة، ولكنها لا تندمج معا .

ومن أمثلتها ثمار كلٍ من الفراولة، والراسبري ، والقشطة ، والشليك.

٣. الثمار المتجمعة:

وتتكون من الثمار الناتجة عن مبايض عدد من الأزهار المجتمعة على نورة واحدة)بحيث تنتج كل زهرة ثمرة)، وتشمل هذه الثمار المركبة أوراقاً، وأعناقاً، وقنابات زهرية بالإضافة إلى مبايض الزهور المحتوية على أجنة النبات وتندمج معا لتنضج في كتلة واحدة .

ومن أمثلة هذه الثمار الزهرية المركبة ثمار كلٍ من التين، والجميز، والتوت، والأناناس .

وهي تعتبر ثماراً غير حقيقية لاشتراك أعداد من أجزاء الزهرة مع المتاع في تكوين الثمرة

الثمار البسيطة:Simple Fruits

وهي التي تنشا من زهرة واحدة وتقسم الى :-

اولا:-الثمار الجافة

أ- الثمار الجافة غير المتفتحة

ب - الثمار الجافة المتفتحة

ثانيا :- الثمار الطرية

الثمار البسيطة الجافة:-

تتميز بان اغلفتها الثلاثة قاسية وجافة عند النضج وقد تكون متخشبة وتقسم الى :

أ- الثمار الجافة المتفتحة

١- القرنة او البقلة : تتكون من كربلة واحدة، ينشق جدار الثمرة إلى مصراعين متصلين من أسفل مثل الباقلاء.

٢- الخردلة : ثمرة طويلة ضيقة ذات حجرتين وتنفتح من أسفل بمصراعين تاركة حاجزاً شفافاً بين المصراعين وعلى هذا الحاجز الشفاف تتوضع البذورمثل الخردل

٣ - العلبة Capsule :

تتكون من كربلتين أو أكثر ، ويمكن تقسيمها تبعا لطريقة انفتاحها لإخراج البذور مثل اليوكالبتوس

٤- الجرابية :

تشبه القرنية مبيضها علوي يتكون من كربلة واحدة لكنها تنفتح من الدرز البطني فقط .مثل نبات الصقلاب

ب- الثمار الجافة غير المتفتحة :

١- الفقيرة(الاكينية) : بذورها لاتخرج من ثمارها عند النضج بل تنتقل مع الثمار. مثل بذرة عباد الشمس

٢- البندقة : ثمرة جافة وحيدة البذرة تشبه الفقيرة الا أن غلاف الثمرة أكثر سمكا وقساوة مما في الفقيرة ، كما أن الثمرة هنا ناتجة عن أتحاد كربلتين أو ثلاث لتكون ردهة واحدة تحتوي على بذرة واحدة منفصلة عن جدار الثمرة، وغلاف الثمرة خشبي . كما في البندق ، الكستناء و البلوط



٣-البُرة : ثَمَرَةٌ جافَّةٌ غَيْرُ مُتَفَتِّحَةٍ ذاتُ بِزْرَةٍ واحِدَة. وهي تشبه الفقيرة الا أن غلاف البذرة هنا ملتحم تماما مع غلاف الثمرة بحيث يصعب فصلها عن بعضهما ، كما في الحنطة، الشعير ، الذرة ، الرز وبقية الحبوب .

٤-الجناحية: ثمرة جافة امتد جدارها الثمري ليشكل جناحا مزدوجا أو مفرد ا ليعطي البذرة قدرة على التنقل مسافات بعيدة في الهواء



الثمار البسيطة الطرية



١- اللبية العنبية

وفيها تبقى الأغلفة الثلاثة الحامية للجنين طرية بعد نضـــج الثمرة فيهـا يكون الجـدار الثمري جلـدي والجداران الداخليان عصيريان،وهي ثمار شحمية ذات بذور عديدة منغرســـة في المادة اللبية للثمرة. مثل العنب والطماطم.



٣- الحسلية (اللوزية):

هي ثمرة بســـيطة لبية، يكون الغلاف الثمري الخارجي جلدي والوســـطي لحمي أو ليفي والداخلي صـــلب ويوجد بداخل الثمرة بذرة واحدة ذات قصـرة غشـائية رقيقة عادة كما في ثمار أشـجار النبق والزنزلخت والمخيط والبامبوزيا. من الأمثلـة الأخرى على هذا النوع من الثمـار ثمـار جنس البرقوق (الذي يضـــم الدراق والخوخ والمشـــمش والكرز وتسمى الثمار الحجرية) إضافة إلى ثمرة الزيتون والمانغو

-

٤-التفاحية : هي ثمرة أشجار التفاح الكمثرى السفرجل ومجموعة التفاحيات ضمن الفصيلة الوردية. تتكون من مبيض الزهرة (وهو يكون قلب الثمرة حيث توجد البذور) إضافة إلى تخت الزهرة الذي يشكل لب الثمرة القابل للأكل ،وهى ثمرة كاذبة. مثل : التفاح والكمثرى

الثمار المركبة

أ- الثمار المتجمعة : وتتكون من الثمار الصغيرة المتشابهة والتي تنشا جميعها من زهرة واحدة ذات كرابل عديدة ومنفصلة وتوجد على تخت لحمي غالبا وهناك انواع منها تختلف حسب نوع الثمرة كان تكون مجموعة من الاكينيات او الحسليات او العنبيات مثل الشليك

ب- الثمار المتضاعفة تتكون من عدة مبايض تعود لمجموعة ازهار تلتصق مع بعضها على شكل كتلة واحدة ومن انواعها :

١- ثمار مركبة توتية مثل التوت

٢- ثمار مركبة تينية مثل التين

العوائل الزهرية (النباتية)

المحاضرة الثامنة

الجزء الاول

Amal Ali Yaseen 2023 -2024

العائلة الصليبية (Brassicaceae (Cruciferae

العائلة الصليبية(الخردلية) تضم هذه العائلة ٣٨٨ من الأجناس ومايقارب ٣٧٠٠ نوع من النباتات العمرة والحولية والإعشاب ومعظمها محاصيل خضروات كاللهانة والقرنابيط والشغلم والفجل تعد معظم الخضر الصليبية من النباتات العشبية ذات الحولين. الخضروات الصليبية تمتاز برائحتها النفاذة وطعمها الذي يميل للمرارة أحيانًا بسبب امتلاكها مركبات الغلوكوسينولات الكبريتية .(Sulfur glucosinolates)



يعود سبب التسمية بالصليبية إلى شكل أزهارها التي تحوي أربع بتلات مرتبة على شكل صليبي وتسمى حالياً الفصيلة الملفوفية Brassicaceae نسبة إلى أشهر أجناسها الملفوف *Brassica*.

كما ان سميت بالخردلية لنوع ثمارها Silique

التصنيف العلمي للعائلةScientific Classification

Kingdom	Plantae المملكة النباتية
Subkingdom	**Tracheobionta** (Vascular plant **النباتات الوعائية**
Superdivision	**Spermatophyta (**seeds plant **النباتات البذرية**)
Division	Magnoliophyta **Angiospermae Flowering plant** **النباتات الزهرية مغطاة البذور**
Class	**Magnoliopsida** (Eudicots) **Dicotyledonous plants** **النباتات ثنائية الفلقة**
Order	Capparales
Family	Brassicaceae/ Cruciferae

Brassicaceae Commonly known as the mustard family contains some 338 genera and more than 3,700 species of flowering plants distributed throughout the world. Brassicaceae species are characterized by four-petalled cross-shaped flowers that feature two long and two short stamens and produce podlike fruits known as siliques..

الجذور

النظام الجذري الوتدي يظهر بوضوح في العديد من جذور افراد العائلة كما في الرشاد *Lepidium sativum* **وكذلك الجذور الوتدية المتضخمة المتمثلة بالجذور المتكورة** (**اللفتية**) napiform root **في الشغلم والفجل الأحمر**

وايضا الجذر الوتدي المتضخم المغزلي Fusiform Root **كما في الفجل الأبيض**

Amal Ali Yaseen 2023 -2024

الأوراق

أوراقها بسيطة ريشية التشقق ، عديمة الاذينات، متبادلة عادة.

والمعروف ان نبات اللهانة *Brassica oleracea var. capitata* ذو اوراق نباتية متحورة لخزن الغذاء اذ تتجمع أوراق النبات وتلتف حول برعم طرفي لتكون الرأس اذ يتوقف البراعم خلال الشتاء وعندئذ يحاط البرعم ب راس محكم من الأوراق التي تحميه من البرد وفي المناطق المعتدلة يبقى الجو دافئ خلال الشتاء بذلك لايسمح للبراعم بفترة كافية من السبات لهذا تستطيل الساق وتتباعد العقد بدلا من ان يتكون برعم كبير مكتظ الأوراق

الازهار

- **الازهار مؤلفة من الكاس ذو ٤ اجزاء منفصلة تقع في حلقتين والتويج صليبي cruciformالتويج مؤلف من ٤ اوراق تويجية منفصلة ومتصالبة وذات مخلب**

Amal Ali Yaseen 2023 -2024



الأسدية ايضا من الصفات التشخيصية المهمة في العائلة الصلبية اذ يمتاز افرادها ب ٦ اسدية منفصلة متباينة الاطوال
Tetradynamous stamens



The flower contains six stamens, out of which four are longer and inner and the rest is shorter and outer In Cruciferae or Brassicaceae or Mustard family, the androecium has 6 stamens that show tetradynamous condition. The stamens are arranged in two whorls. The outer whorl has short stamens while the inner whorl has long stamens..

- المدقة مفردة مركبة من كربلتين متحدتين والمبيض ثنائي الغرف اما الحاجز بين الغرفتين المبيضية فهة حاجز كاذب Replum وتضم الغرفة الواحدة بويض واحد معلق او اكثر والتميشم الجداري Parietal placentation تتصل البيوض بمشايم متصلة بجدار المبيض الذي يعود لمدقة مركبة (اكثر من ورقة كربلية) يتكون حاجز يفصل المبيض إلى أكثر من غرفة واحدة، كما نباتات معظم نباتات العائلة الصليبية

Parietal Placentation in yellow mustard

Amal Ali Yaseen2022

❖ الحاجز الكاذب يصطلح عليه Replum أذ نشأ من نمو المشيمة الجدارية وامتدادها الى المركز المبيض كما في انواع من العائلة الصليبية كالمنثور واللهانة والقرنابيط او كنمو داخلي لجدار المبيض من جهة او منطقة العرق الوسطي لكل كربلة كما في الكتان

In *Brassica* the ovary is unilocular in the beginning but it becomes bilocular due to the formation of a false septum (replum), because it is developed from the thalamus in place of wall of ovary.





الثمار الخردلية Silique

تمتاز نباتات العائلة الصليبية Cruciferae بهذا النوع من الثمار هي ثمار جافة علبية ناشئة من مبيض مرتفع وجداري المياشم ويعود لمدقة ثنائية الكربلة المتحدة ينقسم المبيض الى غرفتين بواسطة حاجز كاذب Replum ناشيء من نمو المشيمة الجداري وامتدادها الى الداخل





Siliqua of Mustard.

تتفتح الخردلة بواسطة مصراعين two valves امتداد حافتي الحاجز من الأسفل نحو الأعلى على عكس انواع الثمار التي كان التفتح فيها من الاعلى الى الأسفل وتبقى البذور متصلة بالحاجز غالباً . هناك تدرج في اطوال الثمار الخردلية فالثمرة التي لايزيد طولها على عرضها تعرف الخرديلة Silicle (silicula)





البذور عديمة السويداء وجدرانها تنتفخ وتصبح جيلاتينية عند الإنبات



Brassica napus subsp. *napus*

Brassica juncea

Brassica rapa subsp. *oleifera*

Brassica juncea

Amal Ali Yaseen 2022

امثلة على العائلة الصليبية

الخردل الأبيض (*Brassica alba (Sinapis alba*

الخردل الاسود(*Brassica nigar (Sinapis nigar*

البروكليBroccoli *Brassica oleracea var. italic*

Cabbage اللهانة *Brassica oleracea var. capitata f. alba*

Wild cabbage الملفوف البري *Brassica oleracea var. oleracea*

Red cabbage اللهانة الحمراء *Brassica oleracea var. capitata f. rubra*

Cauliflowerالقرنابيط *Brassica oleracea var. botrytis*

الشغلم *Brassica rapa*

الفجل *Raphanus sativus*

Matthiola incana المنثول (الشبوي

فجل الحصان horse-radish *Armoracia rusticana*



Arabidopsis thaliana

القرنابيط(Cauliflower) *Brassica oleracea var. botrytis*

الجزء الذي يؤكل هو براعم زهرية ضمن نظام زهري محتشد white inflorescence meristem يتوقف فيه النمو والتفتح الى ازهار وتحدث عدة تغايرات كيميائية لتحول البرعم الزهري الى مواد غذائية متخثرة Curd





العوائل الزهرية (النباتية)

المحاضرة الثامنة

الجزء الثاني

1- **الحنطة (القمح): العائلة النجيلية (Gramineae) الاسم العلمي: (Triticum aestivum L.) الاسم الإنكليزي: (Wheat)**

القمح من نباتات العائلة النجيلية الرئيسية وهو محصول شتوي ويتكون من الاجزاء التالية:

الجـــذور: يوجد نوعان من الجذور عند القمح هما

أ- **الجذور الجنينيـــــة:** عددها (5 – 7) وتنشأ عند إنبات الحبة من اسفل السلامية الأولى للساق وهي جذور مؤقتة.

ب- **الجذور التاجيـــــة:** تتكون أو تنشأ من اسفل السلامية الثانية للساق التي تحت سطح التربة مباشرة وهي الجذور المستديمة في النبات.

الســـــــاق: يحتوي نبات القمح على ساق مجوفة مكونة من (3 –6) عقد وسلاميات وتكون معظم أصناف القمح الناعم مصمتة (مغلقة) في العقد ومجوفة في السلاميات إلا أنها تكون مصمتة في سلاميات بعض أصناف القمح القاسي وفي القليل من أصناف القمح اللين، ويزداد طول السلاميات من أسفل النبات إلى أعلاه وتنتهي السلامية العليا للساق وحامل السنبلة بالسنبلة، قد يكون لون الساق أخضر أو أصفر أو أبيض أو أرجواني .يتراوح ارتفاع نبات القمح بضمنه السنبلة من 50–150 سم وقد يكون أقصر من 50سم في المناطق الديمية وحسب الصنف(طويل، متوسط، قصير) كما يوجد بجانب الساق تفرعات جانبية (الأشطاء) .

الورقـــة :تتكون ورقة القمح من النصل، الغمد، اللسين، الاذينات،

أ- **النصـــل:** ضيق طويل رمحي حاد ويختلف في الطول والعرض وفي درجة الاخضرار وفي زاوية اتصاله مع الساق ويجف ويسقط على الأرض عند نضج النبات وقد يكون ناعم أملس أو زغبي أما لونه فيتميز القمح اللين بنصل أخضر داكن بينما القمح الصلب فنصله أخضر فاتح.

ب- **الغمـــــــــد:** يحيط الغمد بحوالي ثلثي الجزء السفلي من الساق ولونه أخضر أو أبيض أو أرجواني

ت-**اللسيـــــــــن:** يحيط اللسين بالساق ويمتد عند موضع اتصال النصل بالغمد والساق وهو رقيق عديم اللون شفاف وذو حافة هدبية ذات شعيرات دقيقة.



شكل نبات الحنطة يوضح (العقد وغمد وأذين ولسين الورقة)

ث- الأذينـــــــــــات: توجد دائما على الورقة وهي معقوفة بدرجة كبيرة لكنها أقل مما في الشعير وذات شعيرات وغالبا ما يكون لونها أرجواني في الطور المبكر وبيضاء عندما ينضج النبات.

النـــــــــورة: النورة في القمح سنبلة ذات طول عادة يتراوح من 7 إلى 15 سم والسنبلة قد تكون مضغوطة بصورة متوازية أو بزاوية قائمة بالنسبة لسطح السنيبلة وشكل السنبلة إما مغزليا أو مستطيلا أو بيضوياً وقد تكون متماسكة السنيبلات (متراصة) أو غير متماسكة (متباعدة) وتكون السنبلة إما عديمة السفا أو ذات سفا أو قمية السفا **وتتكون السنبلة من:**

أ- **السنيبلـــــــــة:** والتي تتكون بصورة فردية على كل عقدة بصورة متعاقبة على حامل السنبلة المتعرج وسلاميات الحامل السنبلي تكون قصيرة وضيقة في القاعدة وواسعة نسبيا في القمح، واحد من جوانبها محدب والجانب الذي يواجه السنبلة مسطح أو مقعر ويحيط بالسنيبلة غلاف من الجهتين يسمي بالقنابع والتي تكون مجوفة وذات حواف صلبة أو غير حادة قد تمتد إلى نهايتها مكونة طرف مدبب يشبه السفا القصير والقنابع زغبية أو ناعمة عديمة الزغب ذات لون أبيض، أصفر، بني، أسود حسب الصنف ومرحلة النمو.

تحتوي السنيبلـــــة على (1-5 زهيرات) متصلة بصورة متبادلة أو متعاكسة على محور السنيبلة وواحدة أو أكثر من الزهيرات العليا تكون عادة عقيمة والباقية وعددها عادة (2-3) تكون ناضجة وتكّون حبوبا، وتحتوي الزهيرة على عصيفتين

اللذان تغلفان أعضاء الزهيرة وهي ثلاث متوك ومبيض واحد، العصيفة الخارجية تكون زورقية أو مستديرة من جهة الظهر وذات سفا، أما العصيفة الداخلية فتكون غشائية وتقع في الجهة المقابلة للعصيفة الخارجية وهي عديمة السفا، تتكون الحبة بين العصيفة الخارجية والعصيفة الداخلية



الحبة:

حبة القمح بيضاوية الشكل، قليلة أو كثيرة التحدب، في وسطها أخدود عميق ويبدو في نهايتها العلوية القليل من الوبر، أما الجهة السفلية تكون أكثر تفلطحا أين يستقر الجنين. تختلف حبوب القمح في أحجامها وأشكالها وألوانها باختلاف الأصناف.. **تتكون حبة القمح من ثلاثة أنواع من الأنسجة:**

جنين البذرة: ناتج عن التحام الجاميطات الذكرية والأنثوية. كما أنه غني بالبروتينات واللبيدات والسكريات الذائبة.

الأغلفة: تتكون من 5 أنسجة متواضعة فوق بعضها، كل نسيج من هذه الأنسجة له سمُك وطبيعة مختلفة.

السويداء: وهو النسيج الأكثر وفرة في الحبة يتكون من amylace و Albumen وخلايا طبقة الأليرون(Aleurone)

2- نبات الشعير: العائلة النجيلية (Gramineae) الاسم العلمي: (.Hordeum vulgair L) الاسم الإنكليزي(Barley)

يشبه الشعير في شكله العام نبات القمح وخاصة في الأطوار الحياتية المبكرة، من مغطاة البذور، ينتمي الى العائلة النجيلية، من أحاديات الفلقة. وهو محصول شتوي.

الجذور: جذوره ليفية تشبه جذور القمح وتتكون من جذور جنينية وأخرى عرضية تنتشر في الطبقة السطحية من التربة

الساق: قائمة أسطوانية جوفاء مكونة من عقد وسلاميات كساق القمح غير أنها أقصر منها طولا وأغلظ منها سمكا والعقد أضخم .**الأوراق** غمدية كأوراق القمح إلا أن النصل أعرض، لونها أفتح، السطح العلوي للنصل خشن الملمس لوجود الزغب عليه، الأذينات كبيرة تلتف حول الساق واللسين أطول من لسين ورقة القمح.

النورة: سنبلة مؤلفة من محور مكون من عقد وسلاميات عدة (10 – 30 سلامية) يوجد عند كل عقدة ثلاث سنيبلات وفي كل سنيبلة زهرة واحدة فقط. إذ من الممكن أن تكون زهرات السنيبلات الثلاثة خصبة وتعطي كل منها حبة، مكونة ما يعرف بشعير الستة صفوف (صفين من الحبوب بكل جانب) كما يمكن أن تكون زهرة السنبلة الوسطي فقط خصبة والأخيرتان عقيمتين فتعطيان ما يعرف بشعير الصفين (أي صف من كل جانب) ، يوجد في كل سنبلة زوج من القنابع الضيقة تتصل بكل منها بسفا شوكية قصيرة.

الحبة: مغلفة بغلاف خارجي يتكون من العصيفة والاتبة.



صورة لنبات الشعير

3- **محصول الشيلم: العائلة النجيلية (Gramineae) الاسم العلمي:(Secale cereale L.) الاسم الإنكليزي (Rye)** وهو محصول شتوي

الجذور اكثر تفرعا وغزارة من جذور الحنطة، **سيقان** الشيلم اسمك واطول من سيقان الحنطة، **الأوراق** تكون اكثر خشونة واكثر زرقةً في اللون، وتحتوي النسيبلة على ثلاث زهيرات فقط، اثنان منها خصبة وواحدة عقيمة وغلاف السنيبلة (القنبعتين) يكون اضيق ومستدق مقارنة بالحنطة ، والعصافة تكون اعرض وذات حاجز فاصل وتحمل سفا قصير في قمتها، **التلقيح** يكون خلطي ، **والحبة** ارفع من حبة الحنطة ولونها زيتوني بني أو بني مصفر

سنابل الشيلم

بذور نبات الشيلم

4 - الرز (الشلب) العائلة النجيلية(Gramineae) الاسم العلمي: (Oryza sativa L.) الاسم الإنكليزي (Rica)

وهو نبات عشبي حولي ونصف مائي. وهو محصول ربيعي خريفي

المجموعة الجذرية: ليفية وسطحية، وتنتشر في أصناف الرز المائي أفقياً حتى مسافة 20–40سم، أما جذور أصناف المناطق العالية فتنتشر عميقاً في التربة.

الساق: قائمة ومجوفة، يراوح ارتفاعها بين 60 و180سم، وتتشكل على الساق الرئيسية إشطاءات كثيرة في الأتربة الخصبة والمروية، قد يصل عددها إلى 50 إشطاء.

الأوراق: غمدية متبادلة. وتحتوي الأجزاء الهوائية للنبات على صبغة الأنثوسيانين anthocyanin.

النورة الزهرية: عنقودية مفردة أو مجتمعة، ويخرج العنقود الزهري جزئياً أو كلياً من الغمد عند النضج. يراوح عدد الأزهار بين 75 و100 زهرة، وتحتوي كل سنيبلة على ثلاث أزهار تكون زهرتها العليا فقط خصبة، أما الزهرتان السفليتان فتتحولا إلى وريقتين عقيمتين. تتكون الزهرة من ست أسدية تحمل المآبر الحاوية على حبوب اللقاح، ومن قلم قصير يحمل في نهايته ميسمين ريشيين ومبيض مكّون من خلية واحدة تحتوي على بويضة وحيدة، وتحاط الأجزاء الزهرية بعصافتين (قشرتين) داخليتين صغيرتين وعصافة خارجية. يمكن أن تحمل السفا أو تكون أحياناً عديمة السفا.

نبات الارز



الشكل (1) نبات الرز



الشكل (2) بنية زهرة ا لرز

الحبة: تسمى الحبة الناضجة للرز برة Caryopsis، ويراوح طولها بين 3.5 و8مم، وعرضها بين 1.7 و3مم، وسماكتها بين 1.3 و2.3مم. وتتكون من غلاف خارجي وخلايا السويداء الحاوية على المدخرات الغذائية، نظام التلقيح ذاتي.

5- <u>نبات الدخن:</u> العائلة النجيلية (Gramineae) الاسم العلمي: (<u>Panicam miliaceum</u> L.) الاسم الإنكليزي (Pearl millet) موسم الزراعة أما ربيعي أو خريفي.

يتألف الجذر من جذير رئيسي واحد فقط وساقه رفيعة طويلة قوية تبلغ (1.5 – 1 متر) وسلامياته قصيرة **وأوراقه** غمدية عريضة خشنة ذات لسين سميك ولا تحتوي الورقة على اذينات، **والنورة** سنبلة مركبة عنقودية متطاولة رخوة متدلية ذات سنيبلات متزاحمة شكل الحبة مغلفة وحباته صغيرة مدورة بيضاء أو صفراء أو حمراء أو ضاربة إلى السواد تنمو وتنضج بسرعة.

نبات الدخن.

بذور نبات الدخن

6- <u>الذرة الصفراء:</u> العائلة النجيلية (Gramineae) الاسم العلمي (<u>Zea mays</u> L.) الاسم الإنكليزي (Corn)

موسم الزراعة أما ربيعي أو خريفي **<u>الجذور</u>**: ليفية Fibrous وتكون على ثلاثة أنواع هي:

1- الجذور الأولية أو الجنينيةPrimary or Seminal
2- الجذور التاجيةCoronal or crown
3- الجذور الهوائيةBrace or Aerial roots

فالجذور الجنينية تنمو الى الأسفل بعد إنبات البذرة مباشرة ومعدل عددها من 3 – 5 وقد يختلف فيكون من 1 – 13 للنبات الواحد، تنمو من قاعدة العقد الأولى السفلى للساق فوق العقد الفلقية مباشرة، قد تبقى الجذور الأولية حية فعالة حتى يصل النبات الى مرحلة النضج وتتعمق الى مسافة 150 – 180 سم تحت سطح التربة.

<u>الجذور التاجية</u>: وهذه تظهر من عقد الساق السبعة أو الثمانية الأولى في أسفل الساق تحت سطح التربة وعلى بعد 2 – 5 سم.

أما الجذور الهوائية فهي جذور تنشأ من عقد الساق الموجود فوق سطح التربة، من العقد الأولى والثانية عادة وأحيانا من عقد فوقهما، وتستطيل هذه الجذور وتنمو الى الأسفل وعندما تدخل التربة فإنها تقوم بوظيفة الجذور بالإضافة الى عملها في تقوية النبات وتثبيته في التربة. تنتشر جذور الذرة الصفراء في قطر طوله حوالي متر في جميع الاتجاهات أما عمقها فهو حوالي 75 سم في المعدل لكنه قد يصل الى مترين.

(صور الجذور الهوائية للذرة الصفراء)

الساق: يختلف طول الساق من 0.3 – 7.6 متر وقطره من 1.3 – 5.0 مم، السلاميات مستقيمة أسطوانية في القسم العلوي من النبات، أما في القسم السفلي منه فتكون ذات أخدود جانبي. ويتكون برعم في الأخدود في قاعدة السلاميات ما عدا السلامية الطرفية العليا للنبات. وعندما تنمو البراعم تتكون **العرانيس** والساق ذات لب في منطقة السلاميات، وسيقان الذرة الصفراء قائمة. تحتوي سيقان الذرة الصفراء على 8 % سكر وذلك قبل تكوين البذرة وترتفع نسبة السكر فتصل الى 10.5 % في حالة عدم حصول التلقيح أو عند منعه.

الأوراق: تتكون ورقة واحدة من كل عقدة من الساق وتنمو الأوراق على الساق بصورة متبادلة يبلغ طول الورقة نحو 80 سم أو أكثر وعرضها غالبا 9–10 سم وسمكها ربع ملمتر تقريبا، تتكون الورقة من نصلا وغمد ولسين. ويختلف عدد أوراق النبات من 8 – 48 ورقة بحسب الأصناف

النورة: (نظام التزهير)

يعد نبات الذرة وحيدا بين محاصيل الحبوب من حيث نظام التزهير ذلك أن النبات الواحد يحمل نوعين من الأزهار، مذكرة ومؤنثة على نفس النبات ولذلك **فإنه وحيد المسكن**، وتتكون النورات المذكرة في قمة النبات

حيث ينتهي الساق بها أما النورات المؤنثة(العرنوس) فتنشأ من البراعم الموجودة على الساق الرئيسة للنبات وعند منتصفها

النورة الذكرية النورة المذكرة عبارة عن نورة عنقودية توجد عليها السنيبلات في أزواج سنيبلة جالسة والأخرى معنقة وقد تكون أحيانا ونادرا مجاميع من 3 – 4 سنيبلات.

النورة المؤنثة

شكل النورة الذكرية للذرة الصفراء

النورة المؤنثة: النورة المؤنثة هي سنبلة ذات محور سميك هو الكالح Cob الذي يحمل السنيبلات في أزواج وعلى صفوف طويلة وهذا الترتيب الزوجي للسنيبلات هو الذي يجعل عدد صفوف الحبوب في العرنوس زوجيا تحتوي السنيبلة الواحدة على زهرتين أيضا واحدة منهما فقط خصبة وإذا صادف في بعض الأصناف خاصة مفتوحة التلقيح وفي الذرة السكرية وكانت الزهيرة الأخرى خصبة فان ذلك سوف يجعل حبوب العرنوس مزدحمة بدون انتظام وينعدم وجود صفوف طويلة منتظمة من الحبوب على العرنوس.



الحبة: Kernel or Caryopsis

حبة الذرة الصفراء برة محاطة بالغلاف الثمري. تحتوي الحبة على السويداء التي تكون 85 % من الحبة والجنين وهي الجزء الخارجي من الجنين وتسمى القصعة والورقة الفلقية الجنينية وتكونان 10 %، أما الأجزاء الباقية من الحبة فتكون 5 % وتشكل الغلاف الثمري وأغلفة البذرة وبقايا من أنسجة المبيض والحامل السنيبلي الملتصق بأسفل البذور.



شكل (بذرة الذرة الصفراء)



7- **نبات الذرة البيضاء (الذرة الرفيعة): العائلة النجيلية (Gramineae)**

الاسم العلمي: (Sorghum bicolor L. Moench) الاسم الإنكليزي (Sorghum)

الذرة الرفيعة نبات حولي عادة، ولو أن كثيرا من الأصناف قد تعيش لعدة سنوات عن طريق تجديد نموها بواسطة الفروع التي تتكون عند قاعدة النبات. موسم النمو أما ربيعي أو خريفي

الجذور: – ليفية مكونة من العديد من الجذور الرفيعة المتساوية في قطرها وتنمو الجذور الجانبية على الجذر الجنيني الذي ينمو عمودياً إلى الأسفل وتتكون الجذور التاجية بصورة متعاقبة من العقدة القاعدية الى الأعلى وهناك ما يسمى بالجذور الهوائية والتي تنمو على العقد فوق سطح التربة القريبة من السطح، تصل الجذور الى عمق (90 – 120سم) وقد تتعمق الى 180 سم واحياناً تتعمق الى 270 سم في بعض الترب

الساق: السيقان قائمة ويتراوح ارتفاعها من 0.5 – 5 متر، ويتكون الساق من عدد من العقد والسلاميات يتراوح عددها عادةً من (7–18) عقدة وسلامية، وسمك قاعدة الساق يختلف من 2.5 – الى 5 سم، الساق متخشبة أو عصيرية لبنية حلوة أو غير حلوة المذاق.

الأوراق: تتكون ورقة واحدة على كل عقدة وبصورة متبادلة أو متعاكسة على جانبي الساق وكذلك الأخدود الموجود على السلاميات وتكون السيقان والأوراق والأغماد مغطاة بمادة شمعية بيضاء، أوراق الذرة الرفيعة شبيها بأوراق الذرة الصفراء، إلى لإنها أصغر حجماً ويتراوح عددها من 7– 18 ورقة أو تزيد عن ذلك، ويتراوح طول الورقة من 30 – 135 سم وأقصى عرض فيها من 1.5 – 13 سم وحافة الورقة أما تكون منبسطة أو متموجة.

النورة:– النورة عنقودية منضغطة طولها يتراوح بين (7.5– 45 سم) وعرضها (4–20 سم) تحتوي على القليل أو العديد من الفروع الطويلة أو القصيرة التي تنمو على حامل شعيري، تحمل الفروع ذات الحبوب سنيبلات زوجية أحداهما خصبة معنقة والسنيبلة الأخرى غير خصبة جالسة، نظام التلقيح يكون خلطي أو ذاتي.

الحبة: وتسمى البذرة عادة وهي تنفصل من الغلاف الزهري عند الدراس بصورة كاملة في الذرة الحبوبية لكنها تبقى متصلة بالغلاف الزهري في الأنواع الأخرى يتراوح حجم البذرة من (8– 35 ملم) شكلها كروي تقريباً ومسطح نسبياً أما لونها فيكون (ابيض، كريمي، قرمزي، اصفر بني، احمر بني، اسود).

شكل النورة في الذرة الرفيعة (البيضاء)

8 – نبات الشوفان: العائلة النجيلية (Gramineae) الاسم العلمي: (Avena sativa) الاسم الإنكليزي (Oat)

محصول حولي شتوي.. طوله من 50 – 170 سم.. **موعد الزراعة** في العراق منتصف تشرين الثاني **الجذور** ليفية وصغيرة وعديدة مغطاة بالشعيرات الدقيقة وتمتد الى أعماق التربة كلما تقدم النبات في العمر وقد تصل الى أكثر من متر.

الساق: يتراوح 60 – 150 سم ويحتوي على 4–5 سلاميات مجوفة، تسمى السلامية العليا التي تحمل النورة بالحامل الزهري.. وينتج النبات في الظروف الاعتيادية 3–5 فروع قاعدية.

الأوراق: غالباً ما تكون مغطاة بطبقة شمعية وطول الورقة من 20–145 سم وعرضها من 8–30 ملم وتتكون من الغمد والنصل واللسين الذي يتميز بعدد من الأسنان الصغيرة.

النورة: على شكل دالية مفتوحة مكونة من حامل النورة الذي يتفرع الى سنيبلات.. يبلغ من 20 150 سنيبلة تختلف بحسب الصنف والظروف البيئية.

الحبة: ذات شكل مغزلي وتوجد حرشفة على جانب واحد منها لونها مصفر مغطاة بشعيرات طويلة حريرية دقيقة.. طول الحبة يتراوح من 1–1.5 سم وعرضها يقدر نصف طولها تقريباً وهي تتكون من الغلاف والسويداء والجنين.

حبوب نبات الشوفان

ثانياً: المحاصيل البقولية:

1- الباقلاء: من العائلة البقولية (Fabaceae) الاسم العلمي (Vicia faba L.) الاسم الإنكليزي (Broad bean)

الباقلاء وهي نبات حولي قائم يصل طوله الى 1متر، ويعتمد طول النبات وعدد تفرعاتها على الصنف والتربة والظروف الجوية وخدمة المحصول. موعد الزراعة: يفضل زراعه **الباقلاء** في بداية تشرين الأول في المنطقتين الوسطى والجنوبية أما في المنطقة الشمالية فيزرع في متنصف تشرين الأول الى منتصف تشرين الثاني

الجذر: وتدي ذات تفرعات جذرية غزيرة إلا إنها ليست عميقة كجذور الحنطة وقد تمتد لمسافة 60 سم بصورة افقية وتتجه الى الأسفل وفي اغلب الترب تتواجد على الجذور الوتدية والثانوية عقد بيضاء او رمادية تنشأ عن البكتريا العقدية التي تقوم بتثبيت النتروجين الجوي فيها.

الساق: قائم عادةً يحمل فرعاً قاعدياً أو أكثر تنمو من قاعدة النبات وعدد التفرعات 1-6، وطوله 50-200 سم، مضلعة (أربعة أضلاع) بدرجة واضحة ويسوَد عند النضج. وتوجد على الساق عقد تنمو منها الأوراق.

الأوراق: توجد الأوراق بصورة متبادلة على الساق والورقة مركبة ريشية تحتوي 2-7 وريقات بيضية الشكل.

الأزهار: تكون الأزهار في الباقلاء متجمعة عنقودية عددها 2-6 زهرات وتنشأ من أباط الأوراق، والأزهار كبيرة الحجم وهي مثال نموذجي لأزهار العائلة البقولية والزهرة بيضاء اللون فراشية.

الثمار: الثمرة قرنة طويلة كبيرة وسميكة، ويتكون الغلاف القرني من غلاف المبيض الناضج وهي جلدية تتصلب عند النضج ويتغير لونها من الخضراء عند تكوينها وتكاملها الى السوداء عند النضج تحوي بداخلها عدد من البذور (البويضات المخصبة) (1-7) بذرة تفتح الثمرة بواسطة شقين على جانبي الثمرة.

البذور: إن بذرة الباقلاء عريضة مفلطحة صلبة القوام عند النضج، وتتصل البذور بغلاف الثمرة وعند أحد جانبي فتحتها بواسطة السرة التي تتكون من أنسجة بذرية بنية اللون، والبذرة تتكون من الفلقتين تتغلفان بواسطة غلاف البذرة (غلاف البويضة) وهي جلدية صلبة قليلة النفاذية للماء



قرنات محصول الباقلاء بداخلها البذور

نبات الباقلاء

2- <u>العدس:</u> من العائلة البقولية (Fabaceae) الاسم العلمي (<u>Lens culinaris</u>) الاسم الإنكليزي (Lentil)

العدس من المحاصيل البقولية الحولية، موسم الزراعة ربيعي.

الجذر: وتدي قليل التفرع يحتوي عقد جذرية كثيرة وقد يصل عددها الى 70 عقدة جذرية للنبات والتي تحسن من صفات التربة.

<u>الساق</u>: أسطواني شبه قائم عشبي طوله من 30 –75 سم أخضر مشعرة (ذات زغب) عند النمو وتصفر عند النضج ويصعب حصاده ميكانيكياً لذلك يحصد يدوياً.

<u>الأوراق</u>: صغيرة ريشية تحوي 14 وريقة جالسة كل وريقة حوالي 1 سم طولاً والوريقات متقابلة عليها زغب خفيف وتحوي الورقة أذينات صغيرة، ويكون لونها اخضر شاحب مزرق.

أوراق نبات العدس

قرنات العدس

زهرة العدس

بذور العدس

الأزهار: العقد التكاثرية تحمل أزهار فردية أو زوجية أو تحمل ثلاث أزهار أو أربع على حامل صغير والازهار صغيرة 4–8 ملم. طولاً بيضاء اللون أو أرجوانية. والازهار تلقيحها خلطي.

الثمار: تظهر الثمار بعد 3–4– أيام من التلقيح، والثمار ناعمة طولها 1–2 سم وكل ثمرة تحوي 1–2 بذرة، والثمرة قرنة صغيرة مفلطحة قد تبقى الأوراق الكأسية عليها.

البذرة: عدسية الشكل قطرها 2–9 ملم، والقصرة (غلاف البذرة) ملونة أما بني فاتح أو غامق أو اخضر أو اسود.

><><>

الثمرة: الثمرة طولها 2–2.5 سم وعرضها حواي 1–1.5 سم وتحتوي 2–4 بويضة، وهي عبارة عن قرنة قصيرة منبعجة، والثمرة منشقة (أي تفتح من الجانبين) ويبقى القلم والميسم مرتبطاً بغلاف الثمرة حتى نهاية النضج.

البذرة: كروية أو غير منتظمة الشكل مدببة القمة لونها اصفر أو اسمر أو خضراء كريمي ملساء أو خشنة، تحيط بها القصرة (غلاف البويضة والتي تعطي اللون للبذرة) وتتكون من فلقتين وتحوي البذرة نتوء وهي مكان اتصالها بالثمرة ووزن 100 بذرة 25– 60 غم.

بذور وقرنة الحمص

نبات الحمص

4- الهرطمان: من العائلة البقولية (Fabaceae) **الاسم العلمي** (**Lathyrus sativus L.**) **الاسم الإنكليزي (Chicline Vetch)** وهو محصول شتوي

الجذر: وتدي والورقة ريشية مركبة ذات ثلاث وريقات والوريقة بيضوية طويلة مستدقة ذات عرق وسطي بارز وعرقان جانبيان موازيان له واضحان والورقة الطرفية محورة الى محلاق متفرع الى ثلاث فروع وطويل نسبيا.

الزهرة. فردية تحتوي على خمس وريقات كاسية منفصلة خضراء الملمس زغبية ناعمة وتتكون الأوراق التويجية من علم وجناحين وزورق بنفسجي أو ازرق اللون، وتتكون أعضاء التذكير من 1-9 متك وتحيط بأعضاء التأنيث التي تتكون من مبيض طويل وقلم رفيع قصير نسبيا ينتهي بميسم زغبي أقصر قليلا من القلم ابيض اللون وينتهي ببقعة صغيرة صفراء في قمته.

الثمرة: **قرنة** مستطيلة الشكل تقريبا وتتصل بالبذور بصورة طويلة عند موضع اتصال فلقي الغلاف الثمري. تتفتح الثمرة من الجانب المقابل لاتصال البذور ومن جانب واحد فقط، والثمرة ذات بذرة واحدة أو بذرتين أو أكثر

قرنات الهرطمان

زهرة الهرطمان

بذور الهرطمان

5- الماش: من العائلة البقولية **(Fabaceae) الاسم العلمي (Vigna radiata L.) الاسم الإنكليزي (Mung bean)**

نبات حولي **صيفيٌ** قائم يتراوح معدل ارتفاع النبات من 40- 120سم وهذا الاختلاف في الارتفاع يعُود الى اختلاف الأصناف والظروف المناخية والتربة. **الأوراق** ثلاثيةٌ الوسطى منها معنقة والوريقُة الواحدة بيضُويةٌ رمحيةٌ الشكل لها شبه كبيرٌ بأوراق الفاصولياًء خاصة عند بدايةٌ نمو النبات أما **الساق** فتكون قائمة متفرعة ويوُجد زغب على الساق والأوراق والعروق لونه رمادي. **الجذر** وتدي قصيرٌ **والأزهار** صغيرة جداً عديمُة الرائحة يخُتلف لونها باختلاف الأصناف فهي أما بنفسجيٌ أو بيضُاء أو أرجوانية اللون والتلقيحٌ ذاتي مع وجود نسبة لا تتجاوز 1% من التلقيحٌ الخلطي. **القرنة** قصيرة تتكون بداخلها بذور لا تتجاوز عددها 2-4 بذرة للقرنة الواحدة

بذور نبات الماش

قرنات نبات الماش

نبات الماش

قانون الزهري والمسقط الزهري

المحاضرة التاسعة

القانون الزهري(المعادلة الزهرية) flora formula

هو مجموعة من الرموز التي تدل على تركيب الزهرة وايضا تعرف المعادلة الزهرية على انها طريقة لوصف الصفات المظهرية للزهرة معينة بشكل رمز خاصة اذ يرمز الى الحلقات الاربعة للزهرة (الكأس – التويج – الاسدية – المدقات بالرموز التالية هي الحرف الاولى من مصطلحها العلمي

K = calyx
C = corolla
A = androecium
G = gynoecium.

Br	Bracteate
K	Calyx
C	Corolla
P	Perianth
A	Androecium
G	Gynoecium
$\underline{G}$	Superior ovary
$\overline{G}$	Inferior ovary
♂	Male
♀	Female
⚥	Bisexual
⊕	Actinomorphic
%	Zygomorphic
Enclosing figure within brackets	Fusion
Line drawn over symbols of floral parts	Adhesion

المعادلة الزهرية تتضمن التالية

التناظر Symmetry

ازهار شعاعية التناظر Actinomorphic Flower ⊕

ازهار جانبية التناظر zygomorphic **Flower** ٪

ازهار عديمة التناظرasymmetry Flower L

الجنسSexuality

ازهار ثنائية الجنس ⚥ ,hermaphrodite (bisexual)

ازهار مؤنثة ♀ female (pistillate) flower

ازهار مذكرة(staminate) male ♂

الغلاف الزهري perianth

الكأس Calyx (K)

يشار عدد الاوراق الكاسية المنفصلة بعددها

K 6 اي ان عدد الاوراق الكاسية ٦

اما اذ كانت الاوراق الكأسية ملتحمة فيوضع العدد بين قوسين K(6)

اما اذ كان عدد الاوراق الكاسية كبير يشار اليها ∞

التويج Corolla(C)

تطبق نفس رموز وإشارات الكأس

ملاحظة

الغلاف الزهري غير المتميز Perigon

يشار الى نوعه ضمن المعادلة التصنيفية هل هو غلاف تويجي المظهر

او كأسي المظهر وايضا يشار الى نوع الغلاف الزهري المتحور ضمن

المعادلة الزهرية مثلا الكاس الزغبي Paplus ويشار ايضا الى الصفات

المميزة للغلاف الزهري ان وجدت كالمهماز او الأكليل التويجيي

- القنابات Bract يرمز لها Br ويذكر عددها ونوعها
- الاسدية Androeciumيشار اليها برمز A

ويذكر عددها ونوعها هل هي ملتحمة نوع التحامها

او منفصلة وارتكازها

- موقع المبيض في الزهرة

G	superior ovary مبيض مرتفع	ازهار سفلية الاجزاء
$\overline{G}$	inferior ovary مبيض منخفض	ازهار علوية الاجزاء
-G-	half-inferior ovary مبيض نصف منخفض	ازهار محيطية الازهار

- نوع التمشيم يذكر نوع التميشم للزهرة

هل هو محوري- مركزي- حافي- جداري- قمي - قاعدي

المخطط الزهري Floral Diagram

هو مخطط لمقطع عرضي للزهرة بين كل اجزائها



الكأس (الأوراق الكأسية السبلات) يرمز له

التويج (الأوراق التويجية البتلات) يرمز لها

الاسدية يرمز لها

المدقات (موقع في المبيض يظهر نوع التميشم)



Floral diagrams and floral formulae



Floral diagram of family Solanaceae

Floral Formula

$$\oplus\, ♀\!\!\!\nearrow\; K_{(5)}\, \overset{\frown}{C_{(5)}\, A_5}\, \underline{G}_{(2)}$$